

ESTUDIO SOCIAL EN POBLACIÓN BAJO LÍNEA DE POBREZA, NO ALCANZADA POR EL PROYECTO PAÍS

Encuesta en el Área Metropolitana de Buenos Aires

Investigación a cargo del
CEDOP-UBA

Director: Jorge Raúl Jorrat

Buenos Aires, Diciembre de 2007

ÍNDICE

1. Descripción de la muestra	1
2. Aspectos de la situación de pareja	3
3. Información	5
3.1 Información sobre infecciones de transmisión sexual	5
3.2 Información sobre VIH-SIDA	5
3.3 Cómo se puede evitar la transmisión del VIH	7
4. Conductas sexuales	8
4.1 Tipo de pareja sexual actual	8
4.2 Cantidad de parejas sexuales	8
4.3 Edad de inicio de las relaciones sexuales	9
4.4 Uso de preservativos	9
4.5 Percepción de riesgo de contraer VIH	16
5. Conductas de prevención en relación con el VIH	18
6. Accesibilidad al sistema de salud	20
7. Actitudes de discriminación con respecto al VIH-SIDA	22
8. Actitudes con respecto al género y la homosexualidad	25
9. Aspectos de comunicación y sida	28
10. Algunas conclusiones	
. Anexo Cuadros	36
Anexo Cuestionario	97

1. Descripción de la muestra

Se seleccionaron 354 casos del Área Metropolitana de Buenos Aires, respetando las proporciones correspondientes a la Ciudad de Buenos Aires y al Conurbano Bonaerense, para las edades establecidas (15-54 años).

Se realizó una selección aleatoria en las distintas etapas del muestreo, salvo la selección del encuestado, que se obtuvo por cuotas de sexo y edad.

Los puntos muestra se seleccionaron previo ordenamiento según NBI (Censo Nacional de 2001) de los radios de las zonas determinadas (Capital y Conurbano), utilizando dos arranques aleatorios. Se requirió alguna condición de NBI para que un radio fuera tomado en cuenta. Los municipios del Conurbano contemplados en la muestra fueron Avellaneda, Almirante Brown, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General Rodríguez, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Marcos Paz, Merlo, Moreno, Morón, Presidente Perón, Quilmes y San Vicente.

El cuadro siguiente describe las variables sociodemográficas básicas:

Descripción de la muestra

N TOTAL	354	
ZONA	Casos	%
Capital	102	29
Conurbano	252	71
EDAD		
15-24	81	23
25-44	130	37
45 +	143	40
EDUCACIÓN		
Primario Incompleto	58	16
Primario Completo	111	31
Secundario Incompleto	80	23
Secundario Completo	62	18
Terciario Incompleto	16	4
Terciario Completo	10	3
Estudios Universitarios	17	5
NIVEL OCUPACIONAL		
No Manual	72	20
Manual Calificado	70	20
Manual No Calificado	116	33
Sin Ocupación	96	27
SITUACIÓN DE TRABAJO LA SEMANA ANTERIOR:		
Trabajando todo el tiempo	154	43
Trabajando medio tiempo	53	15
Sólo haciendo changas	31	9
Tenía empleo, no trabajó	9	2
Desocupado, despedido	17	5
Estudiante	20	6
Tareas del hogar	63	18
Otro	6	2
Nunca trabajó	1	0
INGRESOS P. CAP. HOGAR		
Menos de \$ 160	124	35
De \$ 160 a \$ 399	124	35
\$ 400 y más	81	23
Sin ingreso / Sin especif.	25	7
ESTADO CIVIL		
Casado	112	32
Unido de hecho	109	31
Divorciado	3	1
Separado	36	10
Viudo	15	4
Soltero, no se casó nunca	14	4
Nunca convivió	65	18

2. Aspectos de la situación de pareja

Algo más de 6 de cada 10 entrevistados convive en situación de pareja, sin diferencias por sexo y aumentando con la edad. Es más relevante en el grupo de edad intermedio (25 a 44 años). Las diferencias por edad son estadísticamente significativas. (Ver Cuadros del Capítulo 2 en el Anexo, páginas 36 a 40).

Si bien la convivencia baja al aumentar el nivel educacional, la tendencia no es significativa. Tampoco hay diferencias atendibles por nivel ocupacional, aunque los trabajadores manuales calificados exhiben el porcentaje mayor. En cuanto a los ingresos del hogar per cápita, la relación parece curvilínea y significativa, siendo la convivencia particularmente mayor en el sector medio de ingresos de la muestra. La convivencia es mayor en el Conurbano que en la ciudad de Buenos Aires y las diferencias son significativas ($p < 0,01$).

El comienzo de la convivencia es más relevante en sector de 18 a 24 años de edad, seguido por los de 25 años y más, mientras los de 17 años o menos exhiben un porcentaje más bajo de comienzo de la convivencia (17%). Sólo dentro de este último grupo tal comienzo disminuye al crecer el nivel educacional.

Las personas que viven actualmente en pareja se dividen prácticamente por mitades entre casados y meros convivientes. Si bien las diferencias no son estadísticamente significativas, las mujeres exhiben porcentajes mayores que los varones de casamiento formal (54% *versus* 44%). Dentro de pautas esperables, el casamiento crece significativamente con la edad.

No se observan diferencias en casamiento por nivel de educación ni por nivel de ingresos per cápita del hogar, mientras que esta circunstancia disminuye al bajar el nivel ocupacional (sin alcanzar significación estadística).

Dejando de lado el tema de la significación estadística, se casan más las mujeres, las personas de mayor edad, las personas en un sector medio de ingresos (dentro de una muestra de sectores de ingresos bajos), los de ocupaciones de mayor nivel (no manuales), sin diferencias por educación. Es mayor en la Capital, comparado con el Conurbano.

3. Información

3.1 Información sobre infecciones de transmisión sexual

Más de 9 de cada 10 oyó hablar de ETS.

De los encuestados, 16 casos mencionaron haber tenido flujo genital muy abundante o úlcera genital. De dichos 16, 14 buscaron algún tipo de consejo o de tratamiento.

14 personas mencionan lo que puede hacer una mujer si sabe que su pareja tiene una ETS, de las cuales 4 dicen que debería negarse, 6 proponer el uso de preservativos y 4 dan otra respuesta.

En cuanto al hombre, 12 dan respuestas, 2 señalan negarse y el resto repite lo visto para las mujeres: 6 proponen el uso de preservativos y 4 dan otra respuesta.

3.2 Información sobre VIH-SIDA

Interrogados sobre las formas de transmisión del sida, casi 4 de cada 10 *respuestas* (37%) señalan a las relaciones sexuales sin especificar, mientras 1 de cada 10 mencionan ya sea relaciones homosexuales (2%) o sexo sin preservativo (8%). En total, la mitad de las respuestas se refieren a las relaciones sexuales. (Ver Cuadros del Capítulo 3 en el Anexo, páginas 41 a 47).

Más de una de cada 10 respuestas (14%) se refieren al uso de drogas (5%) o compartir agujas (9%). El resto se refiere a transfusiones (13%) y a transmisión madre-hijo (2%). Una cuarta parte de las respuestas (25%) se agrupa en "Otros", donde predomina fuertemente la referencia a sangre, contacto con sangre, heridas y cortes.

Si en vez de el total de respuestas referimos los resultados al *total muestral*, prácticamente todos hacen referencia a las relaciones sexuales, ya sea relaciones sexuales sin especificar (71%), sexo sin preservativo (16%) o relaciones homosexuales (4%). Estos resultados son coincidentes con los de la muestra nacional de 2003, lo que sugiere que los niveles de bajos ingresos del Área Metropolitana no exhiben un nivel de información diferenciado con respecto a la población en su conjunto en lo referido a la vinculación de riesgo con contacto sexual.

Estas referencias a las relaciones sexuales no se diferencian por sexo, parecen ser un poco más altas en la edad intermedia (25-44 años), entre aquellos que al menos completaron la escuela primaria, prácticamente no hay diferencias por nivel ocupacional y tiende a aumentar al crecer el nivel de ingresos. Es más alta esta referencia en Capital que en el Conurbano. No hay diferencias según la percepción de grado riesgo personal de contraer el VIH-SIDA. (Nótese que algo más de 2 de cada 10 señalan tener un riesgo moderado a alto de contraer el VIH-SIDA, mientras que 4 de cada 10 creen que es bajo).

En segundo lugar, siempre dentro de los resultados como porcentajes del total muestral, está lo referido al contacto con sangre (mencionado por un 70%), donde un 25% hacen referencia a transfusiones y un 44% a sangre en general, cortes, heridas, etc. Estos valores no se diferencian por sexo, predominan en la edad intermedia (24-44 años), crecen tanto con el nivel educacional, con el ocupacional como con el de ingresos. Casi no hay diferencias entre Capital y Conurbano. Tampoco hay diferencias en este caso según percepción de riesgo personal de contraer el VIH.

A la distancia, el tercer lugar corresponde al uso de drogas (10%) y compartir equipo de inyección (18%), lo que totaliza 28% para estas alternativas. Esta información –o preocupación, quizás- no se diferencia por sexos, es más alta entre los más jóvenes, crece con el nivel educacional, es mayor en las ocupaciones no manuales y no hay ninguna diferencia por nivel de ingresos. La

información tiende a ser más alta en Capital que en el Conurbano. Como en los otros casos, la percepción de riesgo personal de contraer VIH no se vincula a estas alternativas.

3.3 Cómo se puede evitar la transmisión del VIH

El 92% de los encuestados cree que hay algo que una persona puede hacer para evitar la transmisión del virus del sida (Un 96% lo decía en 2003). Un 6% no sabe y sólo un 2% cree que no.

En cuanto a la prevención, todos hacen referencia a los cuidados en las relaciones sexuales. Igual que en 2003, más del 90% menciona el uso de preservativos. Pero cae la proporción que dice no tener sexo con cualquiera (15% en 2003, 8% en 2007). No está discriminado por NSE en 2003.

El evitar el contacto con la sangre también baja de 2003 a 2007, tomando el NSE bajo de 2003 (cae de 37% a 19%). El evitar compartir jeringas se mantiene en alrededor de un 20%.

4. Conductas sexuales

Casi la totalidad, un 97% de los encuestados, tuvo relaciones sexuales alguna vez. No hay diferencias por segmentos sociodemográficos, salvo que un 14% del grupo más joven (15-24 años) no lo hizo todavía (Ver Cuadros del Capítulo 4 en el Anexo, páginas 48 a 67). Para este segmento de nivel bajo a medio bajo de la muestra del AMBA, las relaciones sexuales son algo más generalizado que en la muestra nacional de 2003 (91% en ese caso).

4.1 Tipo de pareja sexual actual

Un valor parecido, aunque algo inferior a 2003, es el porcentaje de parejas estables actuales, para el segmento bajo a medio bajo de la presente muestra del AMBA: 63% ahora, 68% en 2003.

No hay diferencias para Capital y Conurbano (aunque en el Conurbano los porcentajes son mayores), siendo particularmente relevante para las mujeres (74%), para los de edad entre 25 y 44 años (75%) y en los extremos de educación (hasta primaria incompleta y secundaria completa y más. Tiende a ser mayor entre los no manuales y en el sector medio de ingresos de esta muestra de nivel bajo a medio bajo (en estos dos casos las diferencias son significativas).

La otra cara es que los que exhiben mayores porcentajes de parejas ocasionales son los de Capital, los varones, los jóvenes –dentro de pautas esperables-, los trabajadores manuales calificados y el sector de mayores ingresos relativos.

4.2 Cantidad de parejas sexuales

Considerando los que tuvieron relaciones sexuales durante el último año y especifican cantidad (277 casos, casi 8 de cada 10 casos en la muestra), la distribución de la cantidad de parejas sexuales exhibe mayor frecuencia (dos

veces o más) en la Capital, notoriamente mayor entre varones y entre los más jóvenes, tiende a ser mayor (no significativo) cuando aumenta el nivel educacional, es mayor entre los trabajadores manuales y entre los de mayores ingresos relativos.

4.3 Edad de inicio de las relaciones sexuales

Siempre considerando a los que tuvieron relaciones en el último año y especifican edad de comienzo, la edad promedio de inicio sexual es a los 16 años, no siendo estadísticamente significativas las medias para los distintos grupos socio-demográficos. (El promedio de edad de inicio sexual es casi el mismo que el de la muestra nacional de 2003, que era de 17 años). La media *parece tender* a ser más baja (se iniciarían más temprano), para los varones, para los de menor edad, para los que no completaron la educación primaria, para los trabajadores manuales y los de ingresos más bajos.

Sí hay diferencias significativas cuando se consideran *grupos de edad* de comienzo sexual, dentro de la muestra del AMBA. Tales diferencias no son significativas para los encuestados de Capital y Conurbano. Hay diferencias por sexos, donde 4 de cada 10 varones contra 1 de cada 10 mujeres se inició entre los 10 y 14 años. El inicio sexual es más tardío para las personas de 45 a 64 años, para los de mayor educación, para los de mayor nivel ocupacional y, aparentemente, para los de mayores ingresos relativos (aunque en este caso las diferencias no son estadísticamente significativas). Igual que en el caso de la muestra nacional, los que tienen particularmente parejas estables se inician sexualmente más tarde que los que tienen parejas ocasionales.

4.4 Uso de preservativos

Casi 4 de cada 10 encuestados (38%) que tuvieron sexo en el último año (y especifican respuestas) dicen haber usado preservativo la primera vez que

tuvieron relaciones sexuales. Este valor es ligeramente inferior al de la muestra nacional de 2003 (42%), pero ligeramente superior al del sector de NSE bajo de aquella muestra (35%), de comparación más cercana a la muestra actual del AMBA. De todas formas, estas diferencias podrían estar dentro de los errores muestrales (y no muestrales), ya que todas son diferencias pequeñas.

En la encuesta actual del AMBA no hay diferencias significativas por zonas ni por sexo, hay un uso notoriamente más relevante en el grupo más joven (15-24 años), llegando a un 85%. Es interesante notar que estos valores son más altos que los de la muestra de 2003, lo que sugeriría que los jóvenes podrían estar aumentando el uso de preservativos, lo que es más destacable dado que la muestra actual es de sectores bajos y medio-bajos.

El uso de preservativos la primera vez crece con el nivel de educación, sin diferencias significativas por nivel ocupacional o por nivel de ingresos per capita del hogar. Las ocupaciones no manuales parecen tener un mayor uso, independientemente de la significación. Esto, aparentemente, sería algo distinto a lo de la muestra de 2003, ya que el NSE bajo exhibía porcentajes relevantemente menores que los de NSE medio y alto.

Pasando a los que usaron preservativos en la última relación sexual con parejas estables y que especifican respuesta, 3 de cada 10 (29%) lo hicieron. No hay diferencias atendibles por zona o por sexo. Los jóvenes lo hicieron notoriamente más (62%), al igual que aquellos con secundario completo y más (38%). No se observan diferencias por nivel ocupacional o de ingresos.

Estos usos son más bajos que la población general de 2003 (38% en ese momento) y algo más bajos que el NSE bajo de 2003 (33% para este sector en ese momento, más comparable con la muestra actual).

El uso de preservativos en la última relación sexual con parejas ocasionales, para aquellos que tuvieron relaciones el último año, es notoriamente más alto

(más del doble) que en las parejas estables. Un 71% usó, frente a un 75% en la muestra de 2003; comparando con el NSE bajo de 2003 (69%), la frecuencia de uso se mantiene.

No hay diferencias por zona ni por sexo, siendo los jóvenes (86%), seguidos por los de edad intermedia (81%), los que exhiben mayores frecuencias. La pauta por sexo y edad parece similar a la de 2003. No se observan diferencias estadísticamente significativas para nivel educacional, ocupacional o de ingresos. Las proporciones de usuarios parecen mayores en los niveles altos de educación, en las ocupaciones manuales calificadas y en los ingresos intermedios. Aunque no se puede prestar mucha atención a estas desagregaciones, ya que los valores absolutos son bajos (la N total es de 70 casos, que en realidad es una proporción similar o más alta que la de 2003 -700 casos sobre 4000-.)

En el estudio de 2003 se nota que el uso de preservativos, ya sea en relaciones estables u ocasionales, es mayor entre los encuestados de nivel social alto y entre los jóvenes. En el AMBA de 2007, para una muestra de nivel bajo o medio-bajo, *también los jóvenes muestran un comportamiento similar*. Los sectores relativamente más altos de 2007 no muestran un comportamiento definido para las relaciones estables, tienden a mostrarlo para las relaciones ocasionales. El rol de la educación parece tener su efecto en 2007, pero no es definido.

De los que tuvieron relaciones sexuales el último año en parejas estables (y especifican respuestas), un 16% usó preservativo todas las veces, valor más bajo que el 23% de 2003, siendo más cercano al 18% del NSE Bajo en aquel momento. No hay diferencias atendibles por zona o por sexo, aunque para las personas de Capital y para las mujeres parece existir una mayor frecuencia. Los jóvenes (15 a 24 años) decididamente muestran porcentajes más altos en el uso de preservativos todas las veces (36% frente al 16% promedio de la muestra). Este comportamiento de los jóvenes sería parecido al de 2003.

Finalmente, la frecuencia de uso crece con la educación, sin diferencias atendibles por nivel ocupacional o de ingresos per cápita del hogar, aunque los no manuales y los de mayores ingresos relativos tenderían a una mayor frecuencia de uso.

Visto desde el otro extremo, los que nunca usaron preservativos dentro de este grupo de referencia, ascienden al 58%, superior al 45% de la encuesta de 2003 y algo por arriba del NSE Bajo de dicha encuesta (52%).

Pasando al uso de preservativos entre los que tuvieron relaciones sexuales el último año con parejas ocasionales, igual que en 2003 ahora 6 de cada 10 personas de este grupo (61%) usaron preservativos todas las veces. Nótese que el NSE bajo de 2003 llegó al 55%. Para los distintos cortes socio-demográficos no hay diferencias estadísticamente significativas, salvo para el caso de los jóvenes, que nuevamente exhiben el porcentaje mayor de haber usado siempre preservativos. Los varones y los de estudios secundarios completos y más tienden a exhibir mayores porcentajes de usar siempre preservativos.

También visto desde el otro extremo, un 14% no usó nunca preservativos dentro de este grupo, valor ligeramente por debajo del 16% de 2003 y del 20% del NSE Bajo de ese momento.

En general, podría decirse que para las relaciones estables, los valores actuales del AMBA en cuanto a uso de preservativos tienden a ser iguales o peores que los de 2003, mientras que para las relaciones ocasionales los valores tienden a ser iguales o mejores (ver cuadro resumen de ambas encuestas). *Lo que implicaría señalar que la gente se estaría cuidando más en sus relaciones ocasionales.*

En cuanto a quién sugirió el uso de preservativo la última vez en la pareja estable u ocasional durante el último año, 7 de cada 10 encuestados mencionan

la decisión acordada en pareja en el caso de las estables, 4 de cada 10 en las ocasionales. En cambio, sólo 2 de cada 10 encuestados lo sugiere personalmente entre las parejas estables, frente a 5 de cada 10 en las ocasionales. O sea, en la pareja ocasional es más fuerte la decisión del propio encuestado. Esto valores repiten lo encontrado en la muestra nacional de 2003. Si se compara con el NSE Bajo de ese momento, habría valores ligeramente superiores en el AMBA 2007 para la decisión compartida por la pareja, algo inferiores para las decisiones individuales del encuestado, aunque estas diferencias son no atendibles.

En términos de las parejas estables, parece que en el Conurbano la persona encuestada tendería a sugerir en mayores proporciones que en Capital su uso, mientras que la sugerencia compartida sería más relevante en Capital. Los varones encuestados lo sugieren en mayor proporción que las mujeres, mientras que la pareja es señalada algo más por las mujeres. Los más jóvenes sugieren más el uso mientras que entre los de más edad sería ligeramente mayor la iniciativa de la pareja. Las personas encuestadas que no completaron el secundario lo sugieren algo más, mientras que entre los de estudios secundarios completos y más predominaría la iniciativa de la pareja. Los encuestados en ocupaciones menos calificadas tenderían a sugerir ellos mismos el uso, mientras que los de ocupacionales más calificadas lo plantean en pareja. Esta tendencia se repite para los de ingresos bajos -mayor sugerencia del encuestado- y los de ingresos relativos más altos –mayor sugerencia compartida por la pareja-.

Por lo que respecta al uso de preservativo la última vez en parejas ocasionales durante el último año, la propuesta de uso por parte de la persona encuestada es mayor en el Conurbano y por parte de la pareja en la Capital. La sugerencia de los encuestados y la compartida por la pareja predominaría entre los varones, por parte exclusiva de la pareja entre las mujeres. Los mayores lo proponen personalmente, los más jóvenes comparten más la sugerencia en la pareja. La educación baja se vincula a la propuesta personal del encuestado, la

educación alta a compartir la decisión en pareja. En las ocupaciones más calificadas predomina la sugerencia exclusiva de la pareja de la persona encuestada, en las menos calificadas sería más importante el acuerdo de la pareja. En cambio, en los ingresos relativamente bajos predomina la sugerencia exclusiva de la pareja, en los altos el compartir ambos.

Sintetizando la experiencia de parejas estables y ocasionales, la decisión de la persona encuestada de usar preservativos parece más relevante en la Capital, entre los varones, mientras que los jóvenes lo proponen personalmente en la pareja estable y los mayores en las ocasionales. La propuesta personal de usar preservativo tiene más presencia entre los de menor educación, la propuesta acordada en pareja entre los de mayor educación. Los de ocupaciones menos calificadas sugieren ellos mismos el uso en la pareja estable, lo acuerdan en pareja en las ocasionales. Entre los de menores ingresos lo sugiere algo más la pareja del encuestado, entre los de mayores ingresos tiende a ser acordado por ambas partes, ya sean parejas estables u ocasionales. Como se notó, *la sugerencia personal de uso de preservativos es más relevante entre las parejas ocasionales y parece que son los mayores (25 a 64 años) los que particularmente lo plantean en este caso.*

Como una observación complementaria, se obtuvieron ecuaciones de regresión logística. Este enfoque es necesario cuando se cuenta con variables dependientes dicotómicas, tipo usó–no usó preservativos. En el caso en que la variable dependiente se refiere a si usó preservativo en su primera relación sexual, la única variable que entra significativamente en la ecuación es edad, mostrando el signo negativo que el uso crece al bajar la edad. Nótese que sexo toma valor 1 si es varón, 0 en otro caso. Por otro lado, se ha tomado el logaritmo de los ingresos. Se trata en este caso de personas que especifican ingresos.

Usó preservativo en primera relación sexual

<u>Variables Independientes</u>	<u>Coeficientes</u>
Varón	-0,218
Edad	-0,103***
Educación	0,073
Log Ingreso hogar p cap	0,105
Constante	2,433**

N = 339

Pseudo R2 (Cox y Snell) 0,295

* $p < 0,05$; ** $p < 0,01$; *** $p < 0,001$

Si se consideran los que usaron preservativo en parejas ocasionales, quedan unos 70 casos con ingresos. La ecuación de regresión muestra que también en este caso la única variable significativa es la edad, creciendo el uso con parejas ocasionales al disminuir la edad.

Usó preservativo en pareja ocasional

<u>Variables Independientes</u>	<u>Coeficientes</u>
Varón	0,087
Edad	-0,073***
Educación	0,209
Log Ingreso hogar p cap	-0,215
Constante	4,086

N = 70

Pseudo R2 (Cox y Snell) 0,223

* $p < 0,05$; ** $p < 0,01$; *** $p < 0,001$

Finalmente, cuando se considera el uso en parejas estables, además de aumentar el uso al bajar la edad también aumenta al crecer el nivel educacional.

Usó preservativo en pareja estable

<u>Variables Independientes</u>	<u>Coeficientes</u>
Varón	0,166
Edad	-0,079***
Educación	0,256*
Log Ingreso hogar p cap	0,010
Constante	0,911

N = 277

Pseudo R2 (Cox y Snell) 0,198

* $p < 0,05$; ** $p < 0,01$; *** $p < 0,001$

4.5 Percepción de riesgo de contraer VIH

Se distingue un grupo de bajo riesgo (eligen 1, 2 o 3 en una escala de 1 a 7, siendo 7 riesgo muy alto), otro de moderado a muy alto (4 a 7) quedando un tercer grupo, indefinido, que desde que oyó hablar del sida dijo no haber hecho nada para evitar pescárselo, grupo que no respondía la pregunta sobre riesgo.

Esta propuesta es una alternativa a la construcción del grado de exposición a la transmisión del VIH de la muestra del 2003, que no se trataba de percepciones sino de respuestas puntuales y combinaciones de esas respuestas a distintas preguntas. Por ello, las comparaciones serán muy aproximadas.

Tanto para el total muestral como para los que tuvieron relaciones sexuales el último año, en Capital son más los que perciben un riesgo mayor, algo más los varones y los de edad intermedia, los de educación, ocupación e ingresos más altos. Todas estas diferencias son, en general, estadísticamente significativas. Con 2003 la diferencia más atendible es que parecía ser el nivel socioeconómico bajo el que mostraba valores algo mayores de alta exposición, descendiendo la exposición alta al aumentar el nivel de educación. Así, mientras en 2007 la educación tiene un efecto de hacer percibir mayores riesgos en la población baja y medio-baja del AMBA, en 2003 la educación se asocia a un menor nivel de exposición a la transmisión en el país como un todo.

Debe notarse que la proporción de personas que tuvieron relaciones sexuales por dinero en el último año es de un 2,7% en el AMBA en 2007 (9 casos), similar al 2,4% de la muestra nacional de 2003. Los pocos casos del AMBA no permiten mayores análisis. Nótese también que sólo un hombre encuestado en 2007 dijo tener una pareja masculina.

Los que en la escala elegían 1, 2 ó 3 (67% de los 224 casos que contestan esta pregunta), definido como riesgo bajo, señalaban que pensaban que su riesgo

era bajo debido a que eran casados o que tenían una única pareja (52%) y/o porque usaba siempre preservativos (32%). Un 9% dice no consumir drogas. Hay un 44% de otras respuestas, que abarcan el evitar el contacto con sangre, la higiene, cuidarse, informarse, etc.

De los que se perciben con riesgo moderado (eligen 4 en la escala -23%-) señalan la estabilidad de pareja (35%), el uso de preservativos (14%) y el no consumo de drogas (12%). Del lado del riesgo, un 4% indica tener múltiples parejas y un 10% que no usa preservativos. Una mitad cae en "otras respuestas", de distribución variada.

Los que se consideran de alto riesgo eligen 5, 6 ó 7 en la escala (10% de los que contestan esta pregunta), la presencia de múltiples parejas da cuenta de un 27% de los casos y el no uso de preservativos de un 14%. Es interesante ver algunas respuestas de este grupo (22 casos que se consideran de riesgo), registradas en "otras":

DONANTE DE SANGRE
LA ENFERMEDAD ESTÁ MUY AVANZADA
PORQUE LA ENFERMEDAD ESTÁ MUY AVANZADA
LA SOCIEDAD QUE TENEMOS ES PROMISCUA
NO HAY CURA
NO HAY UNA CONCIENCIA GENERAL DE CUIDARSE
NO SOY PREJUICIOSO, NO DISCRIMINO
NO TIENE PAREJA ESTABLE
POR QUE ESTA EXPUESTO AL USAR AGUJAS
PORQUE ALGUNAS VECES NO USÉ PRESERVATIVO
PORQUE ESTÁ EN CONTACTO CON INFECTADO
PORQUE HAY PAREJAS QUE NO SE CONOCEN
PORQUE TRABAJO CON PRESOS

5. Conductas de prevención en relación con el VIH

Dos tercios de los encuestados (64%) dijo que desde que oyó hablar del sida hizo algo para no contraerlo. Este valor está apenas por debajo del de 2003 (era 68%), pero por arriba del NSE Bajo de ese momento (58%). O sea, el sector bajo y medio-bajo del AMBA habría mantenido o mejorado los valores para el total país de 2003. (Ver Cuadros del Capítulo 5 en el Anexo, páginas 68 a 69).

No hay diferencias atendibles entre Capital y Conurbano, siendo los varones y las edades jóvenes e intermedias (15 a 44 años) las que expresarían una conducta potencial de prevención de mayor proporción. Dentro de pautas esperables, estas conductas de prevención aumentan con la educación, el nivel ocupacional y el de ingresos. Las tendencias son similares a 2003.

En cuanto al tipo de conductas adoptadas para evitar el VIH, se observa que 7 de cada 10 que hicieron algo para evitar el VIH y cuyas respuestas pueden codificarse de forma definida, hacen referencia a cuestiones de sexo, fundamentalmente al uso de preservativos en primer lugar y luego a cierta estabilidad de la pareja o evitar las relaciones sexuales ocasionales. Estas respuestas en 2003 alcanzaban a 8 de cada 10. Las conductas referidas a evitar contacto con sangre abarcan 1 de cada 10, cuando en 2003 eran 3 de cada 10. Esto se repite para aquellos que hablan de informarse o controlarse, lo que resulta ligeramente más alto que en 2003. En cuanto al evitar las drogas, en ambas muestras las respuestas alcanzan a un 2% de los que hicieron algo para evitar contraer el sida.

Los que mencionan específicamente el uso de preservativos se habrían mantenido en alrededor de 6 de cada 10 que hacen algo para evitar el VIH: 62% en el país en 2003, 59% en 2007 en el AMBA. Si se tomara el NSE Bajo, es probable que estos valores se equiparen razonablemente. *Lo que indicaría que la campaña para fomentar el*

uso de preservativos, dentro del contexto de la presente comparación –donde los porcentajes de los que hicieron algo desde que oyeron hablar del sida se habrían mantenido-, no habría tenido efectos relevantes.

Sin atender a la significación de las diferencias, los que hicieron algo por evitar el VIH y mencionan referencias en relación al sexo serían algo más del Conurbano, varones, de 15 a 44 años, de educación inferior a secundaria completa, trabajadores manuales y en los extremos de ingresos.

El resto de las respuestas tienen poca entidad cuantitativa como para una distinción por segmentos sociodemográficos. La preocupación por contagio con cuestiones que tengan que ver con evitar el contagio por sangre daría la impresión de que es mayor en Capital, entre las mujeres y entre los de mayor nivel educacional, ocupacional o de ingresos. Es decir, sería una preocupación de los sectores medio-altos relativos de esta muestra. Los aspectos vinculados a lograr mayor información y cuidados no exhiben una pauta sociodemográfica definida. Son muy pocos los casos que hacen referencia a evitar las drogas, aparentemente más altos en Capital y entre varones y jóvenes.

6. Accesibilidad al sistema de salud

La mitad de los encuestados (49%) de este sector bajo a medio-bajo del AMBA tiene acceso potencial al sistema de salud. Este valor queda por debajo de la muestra general de 2003 (60%) y por arriba del NSE Bajo de dicha muestra (45%). En líneas generales, entonces, la afiliación a algún sistema se habría mantenido. Del porcentaje de la muestra del AMBA, 39% corresponde a Obra Social, 6% a Prepaga, 1% a Planes de Emergencia y 3% a Planes Médicos de Hospitales. Esto implica que 8 de cada 10 que tienen cobertura se debe a una Obra Social. (Ver Cuadros del Capítulo 6 en el Anexo, páginas 70 a 76).

Los que tienen alguna cobertura potencial predominan notoriamente en Capital (63% contra 43% del Conurbano), no se diferencian por sexo ni por grupo etario, crece la cobertura –dentro de pautas esperables- con el nivel educacional, ocupacional y de ingresos.

La mitad de los encuestados del sector bajo a medio-bajo del AMBA se hizo alguna vez la prueba del VIH. No hay diferencias atendibles entre Capital y Conurbano, se preocuparon más las mujeres (aunque sin diferencias estadísticamente significativas), los de 25 a 44 años (única diferencia significativa), algo más los de estudios primarios completos y más, los de ocupaciones no manuales y en alguna medida los de mejores ingresos relativos (aunque ninguno de estos tres cortes muestra valores significativos). Las diferencias de edad tienden a coincidir con la muestra de 2003.

En términos de los que se hicieron la prueba del VIH en el último año, un 37% dice haberlo hecho, porcentaje idéntico a la muestra de 2003. También es idéntico el porcentaje de los que no fueron a retirar el resultado de los estudios (6%). Nótese que del total de la muestra del AMBA, 2 de cada 10 se hicieron la prueba en el último año.

Interrogados sobre el conocimiento de lugares donde podría concurrir los que estuvieran dispuestos a hacerse la prueba del VIH, 8 de cada 10 dicen saberlo (igual que en 2003, pero algo mayor que el NSE Bajo de ese momento). No se diferencian por zona ni por sexo. Se destacan significativamente los de 25 a 44 años y los de niveles educacionales y ocupacionales mayores. Parece crecer con el ingreso, pero no es significativo.

A las personas dispuestas a la prueba se las interrogó sobre si sabían a qué lugar concurrir, contestando un 81% que lo haría en un hospital, clínica o salita (valor inferior a la muestra de 2003). Un 3% concurriría a un Centro de detección del VIH. Un 16% dice no saber.

7. Actitudes de discriminación con respecto al VIH/SIDA

Es conocida la preocupación por la discriminación con respecto a las personas que viven con el VIH. De allí el interés de evaluar este punto.

Debe notarse, previamente, que la mitad de los encuestados conoce o conocieron a alguien que tiene el VIH. Este valor es más alto que la muestra general de 2003 pero cercano al encontrado para Capital y Conurbano en ese momento. Las diferencias por segmentos en 2007 no son estadísticamente significativas. Daría la impresión que el conocimiento es algo mayor para los de edad y educación intermedia, para las ocupaciones no manuales y los ingresos más bajos. (Ver Cuadros del Capítulo 7 en el Anexo, páginas 77 a 87).

Para ver discriminación de forma resumida, se construyó un “índice de discriminación” similar al de 2003. Se consideraron como de discriminación baja, media y alta las respuestas a cinco preguntas: 1) ¿Compartiría una comida con una persona que sabe o sospecha que tiene VIH o sida?; 2) ¿Tomaría del mismo vaso que una persona que sabe o sospecha que tiene VIH o sida?; 3) Si un maestro tiene sida, ¿piensa que se le debería permitir seguir enseñando en la escuela?; 4) Si se enterara que alguien que vende frutas y verduras tiene el sida, ¿le seguiría comprando?; 5) Si un miembro de su familia se enfermara de sida, ¿querría que lo mantuviera en secreto?

Siguiendo el criterio de 2003, se tomó como respuestas favorables las respuestas afirmativas a las 4 primeras y negativas a la quinta, construyendo el nivel alto de discriminación el caso de menos de 4 respuestas favorables, el nivel medio para 4 respuestas favorables y el nivel bajo para 5 respuestas favorables.

Igual que en 2003, un tercio de la muestra (34%) tiene un *nivel bajo de discriminación* hacia los enfermos de sida. No se diferencian por zona (parecen algo más en Capital) ni por sexo, predominan en la edad intermedia (25-44

años), crecen con el nivel educacional y ocupacional, predominando en sector de ingresos medios relativos. Esta tendencia es similar a 2003.

El *nivel medio de discriminación* (31%) exhibe valores parecidos a 2003.

El nivel alto de discriminación (35%) esta apenas por debajo del de población general de 2003 y parece menor que el del NSE Bajo de ese año (era 41% en ese momento). Son más en el Conurbano, en los de mayor edad, en los de menor educación, en los manuales no calificados y entre los de ingresos más bajos. *Dentro de pautas esperables, la mayor discriminación se asocia al menor nivel socioeconómico.* Es decir, esta pauta no se diferenciaría de lo que se conoce sobre los problemas de discriminación en general.

Tomando cada una de las preguntas integrantes del índice, se observa que el compartir comida con alguien que tiene o se sospecha que tiene sida, casi 8 de cada 10 (79%) contestan que lo harían, sin diferencias significativas por zona, sexo o edad. La idea de compartir crece con la educación, el nivel ocupacional y los ingresos. En 2003 eran un 86% en población general.

En cuanto a si tomarían de un mismo vaso usado por alguien que tiene o se sospecha que tiene sida, *esta mayor "cercanía" hace caer las proporciones a 6 de cada 10.* Esta respuesta es generalizada, en el sentido que no se diferencia por segmentos sociodemográficos. La proporción fue similar en 2003.

Con respecto a si un maestro con sida debería seguir enseñando, tres cuartas partes (76%) de los encuestados lo aceptan. Esta proporción crece significativamente al aumentar la educación y los ingresos. Eran 82% en 2003.

En cuanto si seguiría comprando frutas y verduras a alguien que tiene sida, algo más de 7 de cada 10 (72%) lo haría. La proporción crece con la educación

y los ingresos, aumentando en el segmento intermedio de edad. La proporción es la misma que en 2003.

Finalmente, los que mantendrían en secreto que un familiar tiene sida son un 14%, que bajan con valores estadísticamente significativos al aumentar la educación y los ingresos. Este valor es la mitad de 2003 (27%). Sin embargo, los que lo mantendrían en secreto eran un 63% en 2003, hoy en el AMBA un 73%, a la vez que en 2003 un 11% no sabía frente a un 13% de la encuesta actual.

8. Actitudes con respecto al género y la homosexualidad

Siguiendo las pautas del estudio de 2003 para explorar los roles diferenciales del hombre y la mujer con respecto a la sexualidad, se construye un índice aproximadamente equivalente, llamado "índice de actitudes hacia el género y la homosexualidad". Las preguntas tenidas en cuenta fueron las siguientes: 1) ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que los hombres mantengan relaciones sexuales antes de casarse?; 2) ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con respecto a que las mujeres mantengan relaciones sexuales antes de casarse?; 3) ¿Y cuál es su posición con respecto al siguiente enunciado ..? "Es aceptable que los hombres cometan infidelidades sexuales"; 4) ¿Y cuál es su posición con respecto a este otro enunciado ..? "Es aceptable que las mujeres cometan infidelidades sexuales"; 5) ¿Para usted la homosexualidad es .. una enfermedad, un vicio, una práctica sexual más? Las respuestas "de acuerdo" en las preguntas de 1 a 4 fueron valuadas en 1 punto, en desacuerdo en 2 puntos, no considerando otras respuestas o no sabe; la pregunta 5 fue valuada en 1 punto si decía "una práctica sexual más", 2 en otro caso, también eliminándose los no sabe. Se obtuvo un rango de 1 a 10, definiendo como nada o poco tradicional los valores de 1 a 4 (15%), moderadamente tradicional de 5 a 7 (52%) y muy tradicional de 8 a 10 (33%).

Los de un alto grado de tradicionalismo son en particular del Conurbano, mujeres, de mayor edad, de menor educación, de bajo nivel ocupacional (no significativo) y de bajos ingresos. O sea, se correspondería con el perfil del nivel alto de discriminación. Los resultados son muy consistentes con 2003, más allá de variaciones en la construcción del índice. (Ver Cuadros del Capítulo 8 en el Anexo, páginas 88 a 95).

Al considerar por separado cada una de las preguntas de este índice, puede observarse que más de 8 de cada 10 (83%) están de acuerdo con *que los hombres mantengan relaciones sexuales antes de casarse*. Este valor es el mismo de 2003. La aprobación es mayor en Capital, entre los varones, entre los

jóvenes, crece con la educación, en alguna medida con los ingresos, sin diferencias para los que viven o no en pareja. Salvo esto último, el perfil es parecido a 2003.

El equivalente de la pregunta anterior para las mujeres muestra que también 8 de cada 10 (80%) lo aprueba, siendo el desacuerdo ligeramente más elevado. Se repiten resultados de 2003. La aprobación es mayor en Capital, entre los varones, baja al aumentar la edad, crece con la educación y en alguna medida con los ingresos, sin diferencias según se tenga o no pareja. Salvo esto último, el perfil es parecido a 2003.

Interrogados acerca de *si es aceptable que los hombres cometan infidelidades sexuales*, menos de 2 de cada 10 (17%) está de acuerdo, valor similar a 2003. No se encuentran diferencias estadísticamente significativas por segmentos sociodemográficos, salvo la mayor aprobación por parte de los hombres y que *parece* crecer con el ingreso. La aceptación es mayor entre los que no tienen pareja. El perfil parece aproximarse al de 2003, con aparentes diferencias.

El equivalente para las mujeres de la pregunta anterior permite ver que la aceptación es ligeramente más baja (14%), valor que llegaba a 16% en 2003. Están particularmente más de acuerdo los hombres –y en desacuerdo las mujeres-, sin diferencias significativas para los otros segmentos, salvo que la proporción de aceptación crece con los ingresos y con la ausencia de pareja. No está clara la similitud de perfil con 2003, aunque lo aquí señalado se da en 2003.

Finalmente, la *percepción de la homosexualidad* lleva a definirla como una enfermedad por un 33% de los encuestados, como un vicio por el 7% y como una práctica sexual más por el 40%, quedando un 20% que no sabe. Respecto de 2003, se mantienen los que la ven como una enfermedad o como un vicio, son menos los que no saben siendo más alto en ese momento el porcentaje de los que la consideran una práctica sexual más. (No existe información publicada

por NSE para 2003 respecto de esta pregunta, pero se indica que las respuestas que dicen "una práctica sexual más" predominan entre los niveles medios y altos). Que es una práctica sexual más es particularmente señalado en Capital, por las mujeres, aumenta al bajar la edad, al crecer tanto la educación como el nivel ocupacional y el de ingresos. El perfil es similar a 2003.

9. Aspectos de comunicación y sida

Dos tercios de los encuestados (64%) dicen haber escuchado o visto alguna información acerca del virus del sida en el último mes. Esto implicaría un crecimiento importante con respecto a 2003, donde sólo un 50% se expresó de esta forma (y particularmente las respuestas afirmativas venían de los sectores altos). No hay diferencias estadísticamente significativas por segmentos sociodemográficos. Las proporciones parecen mayores en Capital, entre las mujeres, con la mayor edad, al aumentar la educación, entre los no manuales y en el sector medio de ingresos. El perfil parece similar a 2003.

En cuanto a las fuentes de información, el medio más citado es la televisión (83%), los medios gráficos (28%) y la radio (24%). En general, estos valores son más altos que en 2003. Si se suman la pareja, familiares, amigos y compañeros, se llega a un 40%. Los trabajadores de la salud son referidos en un 10%, similar a 2003. (Ver Cuadros del Capítulo 9 en el Anexo, página 96).

La TV tiende a ser mencionada más por los varones, por los de mayor edad, crece un poco con la educación, aumenta al bajar el nivel ocupacional, sin diferencias por ingresos.

Los medios gráficos son citados más por las mujeres, los de mayor edad y los de mayor educación.

La radio es mencionada más en particular por la gente de Capital, por los varones, por los de educación más alta, por los trabajadores manuales no calificados pero las personas de mayor ingreso relativo.

La suma de pareja, familiares, amigos y compañeros se destaca más en Capital, entre los varones, notoriamente entre los jóvenes, algo más entre las ocupaciones más altas y entre los de ingreso medio.

Los trabajadores de la salud son mencionados más por las mujeres, los de 25 a 44 años, los de educación primaria completa y más, por los extremos ocupacionales y por los de ingresos bajos.

10. Algunas conclusiones

Algo más de 6 de cada 10 entrevistados convive en situación de pareja, sin diferencias por sexo y aumentando con la edad. Las personas que viven actualmente en pareja se dividen prácticamente por mitades entre casados y meros convivientes.

Más de 9 de cada 10 oyó hablar de ETS. Interrogados sobre las formas de transmisión del sida prácticamente todos hacen referencia a las relaciones sexuales, ya sea relaciones sexuales sin especificar (71%), sexo sin preservativo (16%) o relaciones homosexuales (4%). Estos resultados son coincidentes con los de la muestra nacional de 2003.

El 92% de los encuestados cree que hay algo que una persona puede hacer para evitar la transmisión del virus del sida (Un 96% lo decía en 2003). Un 6% no sabe y sólo un 2% cree que no.

En cuanto a la prevención, todos hacen referencia a los cuidados en las relaciones sexuales. Igual que en 2003, más del 90% menciona el uso de preservativos. Pero cae la proporción que dice no tener sexo con cualquiera (15% en 2003, 8% en 2007).

Considerando a los que tuvieron relaciones en el último año y especifican edad de comienzo, la edad promedio de inicio sexual es a los 16 años. (El promedio de edad de inicio sexual es casi el mismo que el de la muestra nacional de 2003, que era de 17 años).

Hay diferencias por sexos, donde 4 de cada 10 varones contra 1 de cada 10 mujeres se inició entre los 10 y 14 años. El inicio sexual es más tardío para las personas de 45 a 64 años, para los de mayor educación, los de mayor nivel ocupacional y los de mayores ingresos relativos. Igual que en el caso de la

muestra nacional, los que tienen particularmente parejas estables se inician sexualmente más tarde que los que tienen parejas ocasionales.

Casi 4 de cada 10 encuestados (38%) que tuvieron sexo en el último año dicen haber usado preservativo la primera vez que tuvieron relaciones sexuales. Este valor es ligeramente inferior al de la muestra nacional de 2003 (42%), pero ligeramente superior al del sector de NSE bajo de aquella muestra (35%). Pasando a los que usaron preservativos en la última relación sexual con parejas estables, 3 de cada 10 lo hicieron. El uso de preservativos en la última relación sexual con parejas ocasionales, para aquellos que tuvieron relaciones el último año, *es notoriamente más alto (más del doble) que en las parejas estables*. Un 71% usó, frente a un 75% en la muestra de 2003; comparando con el NSE bajo de 2003 (69%), la frecuencia de uso se mantiene.

En el estudio de 2003 se nota que el uso de preservativos, ya sea en relaciones estables u ocasionales, es mayor entre los encuestados de nivel social alto y entre los jóvenes. En el AMBA de 2007, para una muestra de nivel bajo o medio-bajo, *también los jóvenes muestran un comportamiento similar*.

Los que tuvieron relaciones sexuales el último año con parejas ocasionales, 6 de cada 10 de este grupo (61%) usaron preservativos todas las veces, igual que en 2003. Nótese que el NSE bajo de 2003 llegó al 55%. Visto desde el otro extremo, un 14% no usó nunca preservativos dentro de este grupo, valor ligeramente por debajo del 16% de 2003 y del 20% del NSE Bajo de ese momento.

En general, podría decirse que para las relaciones estables, los valores actuales del AMBA en cuanto a uso de preservativos tienden a ser iguales o peores que los de 2003, mientras que para las relaciones ocasionales los valores tienden a ser iguales o mejores. *Lo que implicaría señalar que la gente se estaría cuidando más en sus relaciones ocasionales*.

Sintetizando la experiencia de parejas estables y ocasionales, la decisión de la persona encuestada de usar preservativos parece más relevante en la Capital, entre los varones, mientras que los jóvenes lo proponen personalmente en la pareja estable y los mayores en las ocasionales. La propuesta personal de usar preservativo tiene más presencia entre los de menor educación, la propuesta acordada en pareja entre los de mayor educación. Los de ocupaciones menos calificadas sugieren ellos mismos el uso en la pareja estable, lo acuerdan en pareja en las ocasionales. Entre los de menores ingresos lo sugiere algo más la pareja del encuestado, entre los de mayores ingresos tiende a ser acordado por ambas partes, ya sean parejas estables u ocasionales. Como se notó, *la sugerencia personal de uso de preservativos es más relevante entre las parejas ocasionales y parece que son los mayores los que particularmente lo plantean en este caso.*

En términos de la percepción de riesgo, se distingue un grupo de percepción de bajo riesgo (eligen 1, 2 o 3 en una escala de 1 a 7, siendo 7 riesgo muy alto) con un 67% de los casos y otro de moderado a muy alto (4 a 7) con un 33% de los casos, entre los que respondían a esta pregunta. Un tercio tendería a percibir un riesgo de moderado a muy alto.

Los que en la escala elegían 1, 2 ó 3, definido como riesgo bajo, señalaban que pensaban que su riesgo era bajo debido a que eran casados o que tenían una única pareja (52%) y/o porque usaba siempre preservativos (32%). Un 9% dice no consumir drogas. Hay un 44% de otras respuestas, que abarcan el evitar el contacto con sangre, la higiene, cuidarse, informarse, etc. De los que se perciben con riesgo moderado (eligen 4 en la escala -23%-) señalan la estabilidad de pareja (35%), el uso de preservativos (14%) y el no consumo de drogas (12%). Del lado del riesgo, un 4% indica tener múltiples parejas y un 10% que no usa preservativos. Una mitad cae en "otras respuestas", de distribución variada.

Los que se consideran de alto riesgo eligen 5, 6 ó 7 en la escala (10% de los que contestan esta pregunta), la presencia de múltiples parejas da cuenta de un 27% de los casos y el no uso de preservativos de un 14%.

Dos tercios de los encuestados (64%) dijo que desde que oyó hablar del sida hizo algo para no contraerlo. Este valor está apenas por debajo del de 2003 (era 68%), pero por arriba del NSE Bajo de ese momento (58%). O sea, el sector bajo y medio-bajo del AMBA habría mantenido o mejorado los valores para el total país de 2003.

En cuanto al tipo de conductas adoptadas para evitar el VIH, se observa que 7 de cada 10 que hicieron algo para evitar el VIH, hacen referencia a cuestiones de sexo, fundamentalmente al uso de preservativos en primer lugar y luego a cierta estabilidad de la pareja o evitar las relaciones sexuales ocasionales. Estas respuestas en 2003 alcanzaban a 8 de cada 10.

Los que mencionan específicamente el uso de preservativos y que hacen algo para evitar el VIH se habrían mantenido en alrededor de 6 de cada 10: 62% en 2003, 59% en 2007 en el AMBA. Si se tomara el NSE Bajo, sería probable que estos valores se equipararan razonablemente. *Lo que indicaría que la campaña para fomentar el uso de preservativos, dentro del contexto de la presente comparación –donde los porcentajes de los que hicieron algo desde que oyeron hablar del sida se habrían mantenido-, no habría tenido efectos relevantes.*

La mitad de los encuestados (49%) tiene acceso potencial al sistema de salud. Este valor queda por debajo de la muestra general de 2003 (60%) y por arriba del NSE Bajo de dicha muestra (45%). En líneas generales, entonces, la afiliación a algún sistema se habría mantenido.

También la mitad de los encuestados se hizo alguna vez la prueba del VIH. No hay diferencias atendibles entre Capital y Conurbano, se preocuparon más las mujeres, los de 25 a 44 años (única diferencia significativa), algo más los de estudios primarios completos y más, los de ocupaciones no manuales y en alguna medida los de mejores ingresos relativos. Las diferencias de edad tienden a coincidir con la muestra de 2003.

En términos de los que se hicieron la prueba del VIH en el último año, un 37% dice haberlo hecho y un 6% de ellos no fue a retirar el resultado de los estudios (6%). Estos valores son idénticos a 2003. Nótese que del total de la muestra del AMBA, 2 de cada 10 se hicieron la prueba en el último año.

Interrogados sobre el conocimiento de lugares donde podría concurrir los que estuvieran dispuestos a hacerse la prueba del VIH, 8 de cada 10 dicen saberlo (igual que en 2003, pero algo mayor que el NSE Bajo de ese momento). Se destacan significativamente los de 25 a 44 años y los de niveles educacionales y ocupacionales mayores.

A las personas dispuestas a la prueba se las interrogó sobre si sabían a qué lugar concurrir, contestando un 81% que lo haría en un hospital, clínica o salita (valor inferior a la muestra de 2003). Un 3% concurriría a un Centro de detección del VIH. Un 16% dice no saber.

Debe notarse que la mitad de los encuestados conoce o conocieron a alguien que tiene el VIH. Este valor es más alto que la muestra general de 2003 pero cercano al encontrado para Capital y Conurbano en ese momento.

Visto la importancia del tema de la discriminación, se construyó un "índice de discriminación" similar al de 2003. Como en 2003, un tercio de la muestra (34%) tiene un *nivel bajo de discriminación* hacia los enfermos de sida. El *nivel medio de discriminación* (31%) exhibe valores parecidos a 2003. El nivel alto de discriminación (35%) esta apenas por debajo del de población general de 2003

y parece menor que el del NSE Bajo de ese año (era 41% en ese momento). *Dentro de pautas esperables, la mayor discriminación se asocia al menor nivel socioeconómico.* Es decir, esta pauta no se diferenciaría de lo que se conoce sobre los problemas de discriminación en general.

Siguiendo las pautas del estudio de 2003 para explorar los roles diferenciales del hombre y la mujer con respecto a la sexualidad, se construye un índice aproximadamente equivalente, llamado "índice de actitudes hacia el género y la homosexualidad". Los de un alto grado de tradicionalismo se corresponderían con el perfil del nivel alto de discriminación. Los resultados son muy consistentes con 2003, más allá de variaciones en la construcción del índice.

Dos tercios de los encuestados (64%) escucharon o vieron alguna información acerca del virus del sida en el último mes. Esto *implicaría un crecimiento importante con respecto a 2003*, donde sólo un 50% se expresó de esta forma (y particularmente las respuestas afirmativas venían de los sectores altos). No hay diferencias estadísticamente significativas por segmentos socio-demográficos. Las proporciones parecen mayores en Capital, entre las mujeres, con la mayor edad, al aumentar la educación, entre los no manuales y en el sector medio de ingresos. El perfil parece similar a 2003.

En cuanto a las fuentes de información, el medio más citado es la televisión (83%), los medios gráficos (28%) y la radio (24%). En general, estos valores son más altos que en 2003. Si se suman la pareja, familiares, amigos y compañeros, se llega a un 40%. Los trabajadores de la salud son referidos en un 10%, similar a 2003.

Cuadros correspondientes al capítulo 2 Aspectos de la situación de pareja

PERSONAS QUE CONVIVEN CON UNA PAREJA

Personas que conviven con una pareja según zona

	ZONA		
	CAPITAL	GBA	Total
Conviven	51%	67%	62%
No conviven	49%	33%	38%
Total	100%	100%	100%
N	102	252	354

$p < 0,01$

Personas que conviven con una pareja según sexo

	SEXO		
	Masculino	Femenino	Total
Conviven	62%	63%	62%
No conviven	39%	37%	38%
Total	100%	100%	100%
N	178	176	354

No significativo

Personas que conviven con una pareja según grupo de edad

	GRUPOS DE EDAD			
	15-24	25-44	45-64	Total
Conviven	31%	78%	66%	62%
No conviven	69%	22%	34%	38%
Total	100%	100%	100%	100%
N	81	130	143	354

$p < 0,001$

Personas que conviven con una pareja según nivel educacional

	NIVEL EDUCACIONAL			
	H/ Primaria Incompleta	Prim. Completa H/ Secund. Inc.	Secundaria Completa y +	Total
Conviven	74%	61%	58%	62%
No conviven	26%	39%	42%	38%
Total	100%	100%	100%	100%
N	58	191	105	354

No significativo

Personas que conviven con una pareja según nivel ocupacional

	NIVEL OCUPACIONAL				
	No Manual	Manual Alto	Manual Bajo	No Ocupado	Total
Conviven	60%	67%	59%	66%	62%
No conviven	40%	33%	41%	34%	38%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
N	72	70	116	96	354

No significativo

Personas que conviven con una pareja según ingreso per capita del hogar

TRAMOS DE INGRESO PER CAPITA DEL HOGAR

	Menos de \$160	\$160 a \$399	\$400 y más	Sin esp / sin ing.	Total
Conviven	59%	73%	57%	48%	63%
No conviven	41%	27%	43%	52%	37%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
N	124	124	81	21	350

$p < 0,05$

Personas que conviven con una pareja según tipo de pareja

TIPO DE PAREJA

	Sólo estable	Estab./ Ocas.	Sin pareja	NS/NC	Total
Conviven	43%	11%	10%	25%	31%
No conviven	41%	26%	6%	25%	33%
NS/NC	16%	64%	85%	50%	36%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
N	224	74	52	4	354

$p < 0,001$

EDAD DE COMIENZO DE LA CONVIVENCIA CON PAREJA ACTUAL

Edad de comienzo de la convivencia con pareja actual según zona

ZONA

	Capital	Conurbano	Total
Menos 18 años	12%	20%	18%
18 a 24	54%	51%	52%
25 y más	35%	30%	31%
Total	100%	100%	100%
N	52	169	221
Media	23	23	23

Base: Personas que viven actualmente en pareja

No significativo

Edad de comienzo de la convivencia con pareja actual según sexo

SEXO

	Masculino	Femenino	Total
Menos 18 años	9%	26%	18%
18 a 24	48%	55%	52%
25 y más	43%	19%	31%
Total	100%	100%	100%
N	110	111	221
Media	24	21	23

Base: Personas que viven actualmente en pareja

$p < 0,001$

Edad de comienzo de la convivencia con pareja actual según grupos de edad

	GRUPOS DE EDAD			
	15-24	25-44	45-64	Total
Menos 18 años	44%	19%	10%	18%
18 a 24	56%	50%	53%	52%
25 y más	0%	32%	38%	31%
Total	100%	100%	100%	100%
<i>N</i>	25	101	95	221
Media	18	22	25	23

Base: Personas que viven actualmente en pareja

$p < 0,001$

Edad de comienzo de la convivencia con pareja actual según nivel educacional

	NIVEL EDUCACIONAL			
	H/ Primaria Incomp.	Primaria Com. h/ Secund. Inc.	Secundaria Comp. y más	Total
Menos 18 años	26%	21%	7%	18%
18 a 24	44%	52%	56%	52%
25 y más	30%	27%	38%	31%
Total	100%	100%	100%	100%
<i>N</i>	43	117	61	221
Media	23	22	24	23

Base: Personas que viven actualmente en pareja

$p < 0,10$

Edad de comienzo de la convivencia con pareja actual según nivel ocupacional

	NIVEL OCUPACIONAL				
	No Manual	Manual Alto	Manual Bajo	No Ocupado	Total
Menos 18 años	12%	11%	16%	29%	18%
18 a 24	44%	66%	43%	56%	52%
25 y más	44%	23%	41%	16%	31%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
<i>N</i>	43	47	68	63	221
Media	24	22	25	21	23

Base: Personas que viven actualmente en pareja

$p < 0,01$

Edad de comienzo de la convivencia con pareja actual según ingreso per capita hogar

	TRAMOS DE INGRESO PER CAPITA DEL HOGAR				
	Menos de \$160	\$160 a \$399	\$400 y más	Sin esp / sin ing.	Total
Menos 18 años	26%	14%	13%	8%	18%
18 a 24	47%	58%	46%	58%	52%
25 y más	27%	28%	41%	33%	31%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
<i>N</i>	73	90	46	12	221
Media	22	23	24	25	23

Base: Personas que viven actualmente en pareja

No significativo

ESTADO CIVIL

Estado civil de las personas que conviven según zona

	ZONA		
	Capital	Conurbano	Total
Casado	65%	46%	50%
Conviviente	35%	54%	50%
Total	100%	100%	100%
<i>N</i>	52	169	221

Base: Personas que viven actualmente en pareja

$p < 0,05$

Estado civil de las personas que conviven según sexo

	SEXO		
	Masculino	Femenino	Total
Casado	45%	56%	50%
Conviviente	56%	44%	50%
Total	100%	100%	100%
<i>N</i>	110	111	221

Base: Personas que viven actualmente en pareja

$p < 0,10$

Estado civil de las personas que conviven según grupos de edad

Estado Civil	GRUPOS DE EDAD			Total
	15-24	25-44	45-64	
Casado	12%	38%	74%	50%
Conviviente	88%	62%	26%	50%
Total	100%	100%	100%	100%
<i>N</i>	25	101	95	221

Base: Personas que viven actualmente en pareja

$p < 0,001$

Estado civil de las personas que conviven según nivel educacional

	NIVEL EDUCACIONAL			Total
	H/ Primaria	Prim. Completa	Secundaria	
	Incompleta	H/ Secund. Inc.	Completa y +	
Casado	51%	47%	56%	50%
Conviviente	49%	53%	44%	50%
Total	100%	100%	100%	100%
<i>N</i>	43	117	61	221

Base: Personas que viven actualmente en pareja

No significativo

Estado civil de las personas que conviven según nivel ocupacional

	NIVEL OCUPACIONAL				Total
	No Manual	Manual Alto	Manual Bajo	No Ocupado	
Casado	61%	53%	41%	51%	50%
Conviviente	40%	47%	59%	49%	50%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
<i>N</i>	43	47	68	63	221

Base: Personas que viven actualmente en pareja

No significativo

Estado civil de las personas que conviven según ingresos

	TRAMOS DE INGRESO PER CAPITA DEL HOGAR				
	Menos de \$160	\$160 a \$399	\$400 y más	Sin esp / sin ing.	Total
Casado	40%	58%	46%	75%	50%
Conviviente	60%	42%	56%	25%	50%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
<i>N</i>	73	90	46	12	221

Base: Personas que viven actualmente en pareja

$p < 0,05$

Cuadros correspondientes al capítulo 3 Información

Información sobre VIH-SIDA

PERCEPCIÓN DE RIESGO DE CONTRAER VIH

Percepción de riesgo de contraer VIH según zona

	ZONA			Total
	CAPITAL	GBA		
Riesgo bajo	41%	46%		44%
Riesgo moderado-alto	33%	18%		22%
NS/NC	26%	37%		34%
Total	100%	100%		100%
N	84	215		299

Base: encuestados que tuvieron relaciones sexuales el último año
 $p < 0,05$

Percepción de riesgo de contraer VIH según sexo

	SEXO		Total
	Masculino	Femenino	
Riesgo bajo	47%	41%	44%
Riesgo moderado-alto	26%	17%	22%
NS/NC	27%	42%	34%
Total	100%	100%	100%
N	161	138	299

Base: encuestados que tuvieron relaciones sexuales el último año
 $p < 0,05$

Percepción de riesgo de contraer VIH según edad

	GRUPO DE EDAD			Total
	15-24	25-44	45-64	
Riesgo bajo	52%	49%	34%	44%
Riesgo moderado-alto	25%	28%	14%	22%
NS/NC	23%	23%	52%	34%
Total	100%	100%	100%	100%
N	64	126	109	299

Base: encuestados que tuvieron relaciones sexuales el último año
 $p < 0,001$

Percepción de riesgo de contraer VIH según nivel educacional

	NIVEL EDUCACIONAL			Total
	H/ Primaria Incompleta	Prim. Completa H/ Secund. Inc.	Secundaria Completa y +	
Riesgo bajo	36%	41%	54%	44%
Riesgo moderado-alto	9%	23%	27%	22%
NS/NC	56%	36%	20%	34%
Total	100%	100%	100%	100%
N	45	157	97	299

Base: encuestados que tuvieron relaciones sexuales el último año
 $p < 0,001$

Percepción de riesgo de contraer VIH según nivel ocupacional

	NIVEL OCUPACIONAL				Total
	No Manual	Manual Alto	Manual Bajo	No Ocupado	
Riesgo bajo	42%	49%	45%	41%	44%
Riesgo moderado-alto	31%	25%	20%	15%	22%
NS/NC	27%	25%	35%	45%	34%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
<i>N</i>	64	63	96	76	299

Base: encuestados que tuvieron relaciones sexuales el último año

p<0,10

Percepción de riesgo de contraer VIH según ingreso per capita del hogar

	TRAMOS DE INGRESO PER CAPITA DEL HOGAR				Total
	Menos de \$160	\$160 a \$399	\$400 y más	Sin esp / sin ing.	
Riesgo bajo	42%	44%	49%	35%	44%
Riesgo moderado-alto	19%	18%	29%	35%	22%
NS/NC	38%	38%	22%	29%	34%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
<i>N</i>	99	110	73	17	299

Base: encuestados que tuvieron relaciones sexuales el último año

No significativo

CONOCIMIENTO SOBRE FORMAS DE TRANSMISIÓN DEL VIH, EN CUADROS QUE TOMAN COMO BASE EL TOTAL DE RESPUESTAS

Conocimiento sobre formas de transmisión del VIH según sexo

	SEXO		Total
	Masculino	Femenino	
Por uso de drogas	5	5	5
Compartir agujas	9	9	9
Relaciones sexuales	36	37	37
Relaciones homosexuales	2	2	2
Sexo sin preservativo	10	7	8
Transfusiones	13	13	13
Madre-hijo	1	3	2
Otro	24	25	25
Total %	100	100	100
<i>N (Total respuestas)</i>	334	357	691

Conocimiento sobre formas de transmisión del VIH según grupo de edad

	GRUPOS DE EDAD			Total
	15-24	25-44	45-64	
Por uso de drogas	6	5	4	5
Compartir agujas	13	7	9	9
Relaciones sexuales	35	38	36	37
Relaciones homosexuales	0	1	4	2
Sexo sin preservativo	10	6	9	8
Transfusiones	13	15	11	13
Madre-hijo	2	2	0	2
Otro	22	25	26	25
Total %	100	100	100	100
<i>N (Total respuestas)</i>	156	282	253	691

Conocimiento sobre formas de transmisión del VIH según nivel educacional

	NIVEL EDUCACIONAL			Total
	H/ Primaria Incomp.	Primaria Com. h/ Secund. Inc.	Secundaria Comp. y más	
Por uso de drogas	1	5	5	5
Compartir agujas	8	8	11	9
Relaciones sexuales	40	38	33	37
Relaciones homosexuales	1	2	2	2
Sexo sin preservativo	8	9	8	8
Transfusiones	18	13	12	13
Madre-hijo	0	1	3	2
Otro	23	25	26	25
Total %	100	100	100	100
<i>N (Total respuestas)</i>	<i>84</i>	<i>368</i>	<i>239</i>	<i>691</i>

Conocimiento sobre formas de transmisión del VIH según nivel ocupacional

	NIVEL OCUPACIONAL				Total
	No Manual	Manual Alto	Manual Bajo	No Ocupado	
Por uso de drogas	6	4	5	5	5
Compartir agujas	11	6	10	9	9
Relaciones sexuales	34	35	38	39	37
Relaciones homosexuales	1	2	2	2	2
Sexo sin preservativo	8	14	6	8	8
Transfusiones	14	13	13	13	13
Madre-hijo	1	0	2	2	2
Otro	25	27	25	23	25
Total %	100	100	100	100	100
<i>N (Total respuestas)</i>	<i>158</i>	<i>125</i>	<i>227</i>	<i>181</i>	<i>691</i>

Conocimiento sobre formas de transmisión del VIH según tramo de ingreso per capita del hogar

	TRAMOS DE INGRESO PER CAPITA DEL HOGAR			Total
	Menos de \$160	\$160 a \$399	\$400 y más	
Por uso de drogas	6	4	3	5
Compartir agujas	10	8	9	9
Relaciones sexuales	40	35	37	37
Relaciones homosexuales	1	2	3	2
Sexo sin preservativo	7	9	9	8
Transfusiones	13	11	15	13
Madre-hijo	1	2	1	1
Otro	22	29	23	25
Total %	100	100	100	100
<i>N (Total respuestas, con ingreso)</i>	<i>209</i>	<i>256</i>	<i>144</i>	<i>609</i>

CONOCIMIENTO SOBRE FORMAS DE TRANSMISIÓN DEL VIH, EN CUADROS QUE TOMAN COMO BASE EL TOTAL DE LA MUESTRA

Conocimiento sobre formas de transmisión del VIH según zona

	ZONA		Total
	CAPITAL	GBA	
	%	%	%
Por uso de drogas	12	9	10
Compartir agujas	24	15	18
Relaciones sexuales	69	73	71
Relaciones homosexuales	5	3	4
Sexo sin preservativo	27	12	16
Transfusiones	25	26	25
Sangre, heridas, cortes	48	42	44
Madre-hijo	4	3	3
Otro	6	4	5
NS/NC	2	10	8
<i>N (Total muestra)</i>	<i>102</i>	<i>252</i>	<i>354</i>

Conocimiento sobre formas de transmisión del VIH según sexo

	SEXO		Total
	Masculino	Femenino	
	%	%	%
Por uso de drogas	10	10	10
Compartir agujas	17	18	18
Relaciones sexuales	68	75	71
Relaciones homosexuales	4	3	4
Sexo sin preservativo	19	14	16
Transfusiones	25	26	25
Madre-hijo	1	5	3
Sangre, heridas, cortes	43	45	44
Otro	2	7	5
NS/NC	11	5	8
<i>N (Total muestra)</i>	<i>176</i>	<i>178</i>	<i>354</i>

Conocimiento sobre formas de transmisión del VIH según grupo de edad

	GRUPOS DE EDAD			Total
	15-24	25-44	45-64	
	%	%	%	%
Por uso de drogas	11	12	7	10
Compartir agujas	25	15	15	18
Relaciones sexuales	68	82	64	71
Relaciones homosexuales	0	3	6	4
Sexo sin preservativo	19	14	17	16
Transfusiones	25	32	20	25
Sangre, heridas, cortes	40	50	41	44
Madre-hijo	4	5	1	3
Otro	7	5	11	8
NS/NC	2	5	5	4
<i>N (Total muestra)</i>	<i>81</i>	<i>130</i>	<i>143</i>	<i>354</i>

Conocimiento sobre formas de transmisión del VIH según nivel educacional

	NIVEL EDUCACIONAL				Total
	H/ Primaria	Primaria Com. h/	Secundaria	Total	
	Incomp.	Secund. Inc.	Comp. y más		
%	%	%	%		
Por uso de drogas	2	10	12	10	
Compartir agujas	12	15	26	18	
Relaciones sexuales	59	73	75	71	
Relaciones homosexuales	2	4	4	4	
Sexo sin preservativo	12	17	17	16	
Transfusiones	26	24	28	25	
Madre-hijo	0	2	8	3	
Otro	33	48	58	48	
<i>N (Total muestra)</i>	58	191	105	354	

Conocimiento sobre formas de transmisión del VIH según nivel ocupacional

	NIVEL OCUPACIONAL				Total
	No Manual	Manual Alto	Manual Bajo	No Ocupado	
	%	%	%	%	
Por uso de drogas	13	7	9	9	10
Compartir agujas	24	10	19	17	18
Relaciones sexuales	74	63	74	73	71
Relaciones homosexuales	3	3	4	4	4
Sexo sin preservativo	18	24	11	15	16
Transfusiones	31	23	25	24	25
Sangre, heridas, cortes	50	49	41	39	44
Madre-hijo	3	0	4	4	3
Otro	3	9	8	11	8
NS/NC	6	0	7	4	5
<i>N (Total muestra)</i>	72	70	116	96	354

Conocimiento sobre formas de transmisión del VIH según tramo de ingreso per capita del hogar

	TRAMOS DE INGRESO PER CAPITA DEL HOGAR			
	Menos de	\$160 a	\$400 y más	Total
	\$160	\$399		
%	%	%	%	
Por uso de drogas	10	9	7	10
Compartir agujas	16	17	19	18
Relaciones sexuales	68	72	78	72
Relaciones homosexuales	2	4	5	4
Sexo sin preservativo	11	19	17	16
Transfusiones	23	23	30	25
Sangre, heridas, cortes	33	54	46	44
Madre-hijo	2	4	3	3
Otro	3	5	3	4
NS/NC	15	2	4	8
<i>N (Total muestra)</i>	124	124	81	354

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN

Conocimiento de modos de protección de la transmisión del VIH según sexo y grupo de edad

	SEXO		GRUPO DE EDAD			Total %
	Masculino	Femenino	15-24	25-44	45-64	
	%	%	%	%	%	
Usar preservativos	90	91	91	96	85	91
Tener menos parejas sexuales	1	2	1	1	2	1
Ambos no tener otras parejas	3	2	1	1	4	2
No tener sexo con cualquiera	8	9	4	13	6	8
No tener relaciones sexuales	2	1	1	1	1	1
No tener sexo por dinero	0	1	0	0	1	0
Evitar inyección c/aguja contaminadas	18	23	26	23	16	21
Evitar transfusiones de sangre	5	10	8	8	7	8
Sangre, heridas, cortes	9	13	9	14	10	11
Otra	14	17	15	23	9	15
NS / NC	5	5	9	14	10	12
<i>N</i>	174	173	78	129	140	347

Conocimiento de modos de protección de la transmisión del VIH según nivel educacional y nivel

	NIVEL EDUCACIONAL				NIVEL OCUPACIONAL			Total %
	H/ Primaria	Prim Com. h/ Secund. Inc.	Secundar.	No Manual	Manual	Manual	No	
	Incomp.		Com. y +		Alto	Bajo	Ocupado	
	%	%	%	%	%	%	%	%
Usar preservativos	78	91	97	97	94	90	83	91
Tener menos parejas sexuales	0	2	1	3	1	0	2	1
Ambos no tener otras parejas	0	2	5	4	1	2	2	2
No tener sexo con cualquiera	7	7	11	13	7	7	7	8
No tener relaciones sexuales	0	1	2	3	1	0	1	1
No tener sexo por dinero	0	1	0	1	0	0	0	0
Evitar inyección c/aguja contaminadas	11	14	38	39	16	17	14	21
Evitar transfusiones de sangre	0	8	11	11	4	5	10	8
Sangre, heridas, cortes	11	11	13	16	12	9	11	11
Otra	11	14	19	15	10	19	15	16
NS / NC	15	4	2	1	4	4	10	5
<i>N</i>	55	189	103	71	68	115	93	347

ocupacional

Conocimiento de modos de protección de la transmisión del VIH según tramo de ingreso del hogar per capita y zona

	TRAMO DE INGRESO PER CAPITA HOGAR				ZONA		Total %
	Menos de	\$160 a	\$400 y más	Capital	Conur-		
	\$160	\$399			bano		
	%	%	%	%	%	%	%
Usar preservativos	88	91	94	95	89		91
Tener menos parejas sexuales	2	1	3	1	2		1
Ambos no tener otras parejas	1	3	4	4	2		2
No tener sexo con cualquiera	3	13	9	9	8		8
No tener relaciones sexuales	2	1	1	1	1		1
No tener sexo por dinero	0	1	0	0	0		0
Evitar inyección c/aguja contaminadas	12	26	26	27	18		21
Evitar transfusiones de sangre	4	9	11	5	9		8
Sangre, heridas, cortes	11	13	10	9	12		11
Otra	18	13	17	18	15		16
NS / NC	7	3	5	3	6		5
<i>N</i>	123	120	80	100	247		347

48

Respuestas correctas e incorrectas a transmisión por mosquitos e inodoro según zona y sexo (% horizontales)

Respuestas a forma de transmisión:	ZONA			SEXO		
	Capital	Conurbano	N Zona	Masculino	Femenino	N Sexo
Incorrectas por mosquito e inodoro, o NS	26%	74%	102	51%	49%	65
Correctas ambas, alguna, o NS una de las dos	29%	71%	252	50%	50%	289
Peso en la muestra ->	29%	71%	354	50%	50%	354

Ni zona ni sexo son significativas

Respuestas correctas e incorrectas a transmisión por mosquitos e inodoro según zona y sexo (% horizontales)

Respuestas a forma de transmisión:	GRUPO DE EDAD			NIVEL EDUCACIONAL		
	15-24 años	25-44 años	45-64 años	H/ Primaria Incomp.	Prim Com h/ Sec Inc	Secundar. Com. y +
Incorrectas por mosquito e inodoro, o NS	32%	20%	48%	39%	46%	15%
Correctas ambas, alguna, o NS una de las dos	21%	41%	39%	11%	56%	33%
Peso en la muestra ->	23%	37%	40%	16%	54%	30%

Edad y educación son significativas ($p < 0,001$)

Respuestas correctas e incorrectas a transmisión por mosquitos e inodoro, según nivel ocupacional y tramo de ingresos per capita del hogar (% horizontales)

Respuestas a forma de transmisión:	No Manual	Manual Alto	Manual Bajo	Menos de \$ 160	\$160 a \$399	\$400 y más
	Incorrectas por mosquito e inodoro, o NS	17%	19%	37%	42%	28%
Correctas ambas, alguna, o NS una de las dos	21%	20%	32%	34%	37%	23%
Peso en la muestra ->	20%	20%	33%	35%	35%	23%

1) Ni ocupación ni ingresos son significativas; 2) la suma horizontal para ocupación o para ingresos no da 100% porque se han excluido de la presentación del cuadro los no ocupados y aquellos sin ingresos especificados.

RESULTADOS GLOBALES DE CONOCIMIENTO DE FORMA DE TRANSMISIÓN PARA LAS CINCO PREGUNTAS CONSIDERADAS

¿Se puede contraer VIH ..?	Respuestas a 5 preguntas de conocimiento:			
	SÍ	NO	NS/NC	TOTAL
Por picadura de mosquitos	33%	45%	22%	100%
Por usar el mismo inodoro de alguien con VIH	19%	68%	12%	100%
De madre a hijo	84%	7%	9%	100%
Durante el embarazo o el parto	82%	7%	11%	100%
A través de la lactancia	42%	30%	28%	100%

Los números en bastardilla indican respuestas incorrectas

Cantidad de respuestas correctas a información sobre VIH:

	%	% Acum.
Todas correctas	15	15
Cuatro correctas	31	46
Tres correctas	29	75
Dos correctas	15	90
Una correcta	6	96
Ninguna correcta	4	100
Total	100	
N	354	

Cuadros correspondientes al capítulo 4 *Conductas sexuales*

TIPO DE PAREJA SEXUAL ACTUAL

Tipo de pareja actual según zona

	ZONA		
	CAPITAL	GBA	Total
Sólo Estable	58%	66%	63%
Estable y Ocasional	26%	19%	21%
Sin pareja	17%	16%	16%
Total	100%	100%	100%
<i>N</i>	102	252	354

Base: personas que tuvieron relaciones sexuales hasta hace meses; se excluyen 9 casos
No significativo

Tipo de pareja actual según sexo

	SEXO		Total
	Masculino	Femenino	
Sólo Estable	53%	74%	63%
Estable y Ocasional	36%	6%	21%
Sin pareja	11%	21%	16%
Total	100%	100%	100%
<i>N</i>	178	176	354

Base: personas que tuvieron relaciones sexuales hasta hace meses; se excluyen 9 casos
 $p < 0,001$

Tipo de pareja actual según grupo de edad

	GRUPO DE EDAD			Total
	15-24	25-44	45-64	
Sólo Estable	41%	75%	65%	63%
Estable y Ocasional	40%	21%	11%	21%
Sin pareja	20%	4%	25%	16%
Total	100%	100%	100%	100%
<i>N</i>	81	130	143	354

Base: personas que tuvieron relaciones sexuales hasta hace meses; se excluyen 9 casos
 $p < 0,001$

Tipo de pareja actual según nivel educacional

	NIVEL EDUCACIONAL			Total
	H/ Primaria Incompleta	Prim. Completa H/ Secund. Inc.	Secundaria Completa y +	
Sólo Estable	69%	58%	71%	63%
Estable y Ocasional	12%	24%	21%	21%
Sin pareja	19%	19%	9%	16%
Total	100%	100%	100%	100%
<i>N</i>	58	191	105	354

Base: personas que tuvieron relaciones sexuales hasta hace meses; se excluyen 9 casos
 $p < 0,05$

Tipo de pareja actual según nivel ocupacional

	NIVEL OCUPACIONAL				Total
	No Manual	Manual Alto	Manual Bajo	No Ocupado	
Sólo Estable	64%	60%	58%	72%	63%
Estable y Ocasional	22%	30%	25%	8%	21%
Sin pareja	14%	10%	17%	20%	16%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
<i>N</i>	72	70	116	96	354

Base: personas que tuvieron relaciones sexuales hasta hace meses; se excluyen 9 casos
 $p < 0,05$

Tipo de pareja actual según ingreso per capita del hogar

	TRAMOS DE INGRESO PER CAPITA DEL HOGAR				Total
	Menos de \$160	\$160 a \$399	\$400 y más	Sin esp / sin ing.	
Sólo Estable	61%	73%	59%	40%	63%
Estable y Ocasional	20%	17%	30%	16%	21%
Sin pareja	19%	11%	11%	44%	16%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
<i>N</i>	124	124	81	25	354

Base: personas que tuvieron relaciones sexuales hasta hace meses; se excluyen 9 casos
 $p < 0,001$

CANTIDAD DE PAREJAS SEXUALES EN EL ÚLTIMO AÑO

Cantidad de parejas sexuales según zona

	ZONA		Total
	CAPITAL	GBA	
1	56%	70%	66%
2 o más	44%	30%	34%
Total	100%	100%	100%
<i>N</i>	78	199	277

Base: personas que mantuvieron relaciones sexuales en el último año
 $P < 0,05$

Cantidad de parejas sexuales según sexo

	SEXO		Total
	Masculino	Femenino	
1	50%	83%	66%
2 o más	50%	18%	34%
Total	100%	100%	100%
<i>N</i>	140	137	277

Base: personas que mantuvieron relaciones sexuales en el último año
 $P < 0,001$

Cantidad de parejas sexuales según grupo de edad

	GRUPO DE EDAD			Total
	15-24	25-44	45-64	
1	28%	70%	83%	66%
2 o más	72%	31%	17%	34%
Total	100%	100%	100%	100%
<i>N</i>	57	118	102	277

Base: personas que mantuvieron relaciones sexuales en el último año
 $P < 0,001$

Cantidad de parejas sexuales según nivel educacional

	NIVEL EDUCACIONAL				Total
	H/ Primaria Incompleta	Prim. Completa H/ Secund. Inc.	Secundaria Completa y +		
1	80%	63%	64%	66%	
2 o más	21%	37%	36%	34%	
Total	100%	100%	100%	100%	
<i>N</i>	44	145	88	277	

Base: personas que mantuvieron relaciones sexuales en el último año
No significativo (p = 0,12)

Cantidad de parejas sexuales según nivel ocupacional

	NIVEL OCUPACIONAL				Total
	No Manual	Manual Alto	Manual Bajo	No Ocupado	
1	65%	57%	60%	81%	66%
2 o más	35%	43%	40%	19%	34%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
<i>N</i>	60	53	89	75	277

Base: personas que mantuvieron relaciones sexuales en el último año
p < 0,01

Cantidad de parejas sexuales según ingreso per capita del hogar

	TRAMOS DE INGRESO PER CAPITA DEL HOGAR				Total
	Menos de \$160	\$160 a \$399	\$400 y más	Sin esp / sin ing.	
1	72%	71%	51%	60%	66%
2 o más	28%	29%	49%	40%	34%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
<i>N</i>	92	105	65	15	277

Base: personas que mantuvieron relaciones sexuales en el último año
p < 0,05

CANTIDAD DE PAREJAS SEXUALES EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS

Cantidad de parejas sexuales en los últimos cinco años según zona

	ZONA		Total
	CAPITAL	GBA	
1	43%	55%	52%
2 o +	33%	24%	27%
NS/NC	24%	21%	22%
Total	100%	100%	100%
<i>N</i>	102	252	354

Base: personas que mantuvieron relaciones sexuales en el último año
P < 0,10

Cantidad de parejas sexuales en los últimos cinco años según sexo

	SEXO		
	Masculino	Femenino	Total
1	39%	64%	52%
2 o +	39%	14%	27%
NS/NC	21%	22%	22%
Total	100%	100%	100%
N	178	176	354

Base: personas que mantuvieron relaciones sexuales en el último año
P<0,001

Cantidad de parejas sexuales en los últimos cinco años según grupo de edad

	GRUPO DE EDAD			
	15-24	25-44	45-64	Total
1	20%	63%	59%	52%
2 o +	51%	28%	12%	27%
NS/NC	30%	9%	29%	22%
Total	100%	100%	100%	100%
N	81	130	143	354

Base: personas que mantuvieron relaciones sexuales en el último año
P<0,001

Cantidad de parejas sexuales en los últimos cinco años según nivel educacional

	NIVEL EDUCACIONAL			
	H/ Primaria Incompleta	Prim. Completa H/ Secund. Inc.	Secundaria Completa y +	Total
1	60%	48%	53%	52%
2 o +	16%	28%	31%	27%
NS/NC	24%	24%	16%	22%
Total	100%	100%	100%	100%
N	58	191	105	354

Base: personas que mantuvieron relaciones sexuales en el último año
No significativo

Cantidad de parejas sexuales en los últimos cinco años según nivel ocupacional

	NIVEL OCUPACIONAL				
	No Manual	Manual Alto	Manual Bajo	No Ocupado	Total
1	54%	43%	46%	64%	52%
2 o +	29%	33%	31%	15%	27%
NS/NC	17%	24%	23%	22%	22%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
N	72	70	116	96	354

Base: personas que mantuvieron relaciones sexuales en el último año
P<0,05

Cantidad de parejas sexuales en los últimos cinco años según ingreso per capita del hogar

TRAMOS DE INGRESO PER CAPITA DEL HOGAR

	Menos de \$160	\$160 a \$399	\$400 y más	Sin esp / sin ing.	Total
1	53%	61%	41%	36%	52%
2 o +	21%	24%	40%	24%	27%
NS/NC	26%	15%	20%	40%	22%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
N	124	124	81	25	354

Base: personas que mantuvieron relaciones sexuales en el último año

$P < 0,01$

EDAD DE INICIO SEXUAL

Edad de inicio sexual según zona

	ZONA		
	CAPITAL	GBA	Total
10 a 14 años	26%	30%	28%
15a 16 años	34%	37%	36%
17 a 19 años	28%	28%	28%
20 a 26 años	12%	6%	8%
Total	100%	100%	100%
N	82	210	292
Media	16	16	16

Base: personas que tuvieron relaciones sexuales en el último año y especifican una edad de inicio sexual

No significativo

Edad de inicio sexual según sexo

	SEXO		
	Masculino	Femenino	Total
10 a 14 años	44%	10%	28%
15a 16 años	35%	37%	36%
17 a 19 años	21%	36%	28%
20 a 26 años	0%	17%	8%
Total	100%	100%	100%
N	156	136	292
Media	15	17	16

Base: personas que tuvieron relaciones sexuales en el último año y especifican una edad de inicio sexual

$p < 0,001$

Edad de inicio sexual según grupo de edad

	GRUPOS DE EDAD			
	15-24	25-44	45-64	Total
10 a 14 años	28%	32%	25%	28%
15a 16 años	41%	42%	26%	36%
17 a 19 años	27%	20%	37%	28%
20 a 26 años	5%	6%	12%	8%
Total	100%	100%	100%	100%
N	64	123	105	292
Media	16	16	17	16

Base: personas que tuvieron relaciones sexuales en el último año y especifican una edad de inicio sexual

$p < 0,05$

Edad de inicio sexual según nivel educacional

	NIVEL EDUCACIONAL			Total
	H/ Primaria Incompleta	Prim. Completa H/ Secund. Inc.	Secundaria Completa y +	
10 a 14 años	36%	33%	18%	28%
15a 16 años	32%	41%	31%	36%
17 a 19 años	30%	21%	38%	28%
20 a 26 años	2%	6%	14%	8%
Total	100%	100%	100%	100%
N	44	153	95	292
Media	15	16	17	16

Base: personas que tuvieron relaciones sexuales en el último año y especifican una edad de inicio sexual

$p < 0,01$

Edad de inicio sexual según nivel ocupacional

	NIVEL OCUPACIONAL				Total
	No Manual	Manual Alto	Manual Bajo	No Ocupado	
10 a 14 años	22%	38%	33%	19%	28%
15a 16 años	27%	38%	30%	49%	36%
17 a 19 años	37%	22%	29%	23%	28%
20 a 26 años	14%	2%	8%	8%	8%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
N	63	63	93	73	292
Media	17	15	16	16	16%

Base: personas que tuvieron relaciones sexuales en el último año y especifican una edad de inicio sexual

$p < 0,05$

Edad de inicio sexual según ingreso per capita del hogar

	TRAMOS DE INGRESO PER CAPITA DEL HOGAR				
	Menos de \$160	Menos de \$160	Menos de \$160	Menos de \$160	Menos de \$160
10 a 14 años	34%	24%	25%	40%	28%
15a 16 años	40%	32%	39%	20%	36%
17 a 19 años	22%	32%	28%	33%	28%
20 a 26 años	4%	11%	8%	7%	8%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
N	97	108	72	15	292
Media	15%	16%	16%	16%	16%

Base: personas que tuvieron relaciones sexuales en el último año y especifican una edad de inicio sexual

No significativo

Edad de inicio sexual según tipo de pareja

	TIPO DE PAREJA		Total
	Estable	Estable y Ocasional	
10 a 14 años	21%	47%	28%
15a 16 años	36%	39%	36%
17 a 19 años	32%	14%	28%
20 a 26 años	11%	0%	8%
Total	100%	100%	100%
N	217	74	291

Base: personas que tuvieron relaciones sexuales hasta hace meses; se excluyen 9 casos

MUJERES QUE ESTÁN EMBARAZADAS O LO ESTUVIERON EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS

Mujeres que están embarazadas o lo estuvieron en los últimos 10 años según zona

	ZONA			Total
	CAPITAL	GBA		
Sí	30%	25%		26%
No	70%	75%		74%
Total	100%	100%		100%
N	50	126		176

No significativo

Mujeres que están embarazadas o lo estuvieron en los últimos 10 años según grupo de edad

	GRUPO DE EDAD			Total
	15-24	25-44	45-64	
Sí	63%	22%	10%	26%
No	37%	78%	90%	74%
Total	100%	100%	100%	100%
N	38	68	70	176

$p < 0,001$

Mujeres que están embarazadas o lo estuvieron en los últimos 10 años según nivel educacional

	NIVEL EDUCACIONAL			Total
	H/ Primaria Incompleta	Prim. Completa H/ Secund. Inc.	Secundaria Completa y +	
Sí	9%	18%	48%	26%
No	91%	82%	52%	74%
Total	100%	100%	100%	100%
N	32	88	56	176

$p < 0,001$

Mujeres que están embarazadas o lo estuvieron en los últimos 10 años según nivel ocupacional

	NIVEL OCUPACIONAL				Total
	No Manual	Manual Alto	Manual Bajo	No Ocupado	
Sí	37%	14%	20%	28%	26%
No	63%	86%	80%	72%	74%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
N	35	14	51	76	176

No significativo

Mujeres que están embarazadas o lo estuvieron en los últimos 10 años según ingreso per capita del hogar

	TRAMOS DE INGRESO PER CAPITA DEL HOGAR				Total
	Menos de \$160	\$160 a \$399	\$400 y más	Sin esp / sin ing.	
Sí	21%	28%	33%	30%	26%
No	79%	73%	67%	70%	74%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
N	67	69	30	10	176

No significativo

Uso de preservativos

USO PRESERVATIVOS LA PRIMERA RELACIÓN SEXUAL

Uso preservativos la primera relación sexual según zona

	ZONA		
	CAPITAL	GBA	Total
Sí	40%	36%	38%
No	60%	64%	63%
Total	100%	100%	100%
N	82	209	291

Base: encuestados que tuvieron relaciones sexuales el último año y se acuerdan de si usaron o no preservativos la primera vez

No significativo

Uso preservativos la primera relación sexual según sexo

	SEXO		
	Masculino	Femenino	Total
Sí	35%	40%	38%
No	65%	60%	63%
Total	100%	100%	100%
N	158	133	291

Base: encuestados que tuvieron relaciones sexuales el último año y se acuerdan de si usaron o no preservativos la primera vez

No significativo

Uso preservativos la primera relación sexual según grupo de edad

	GRUPO DE EDAD			
	15-24	25-44	45-64	Total
Sí	83%	35%	13%	38%
No	18%	65%	87%	63%
Total	100%	100%	100%	100%
N	63	123	105	291

Base: encuestados que tuvieron relaciones sexuales el último año y se acuerdan de si usaron o no preservativos la primera vez

$p < 0,001$

Uso preservativos la primera relación sexual según nivel educacional

	NIVEL EDUCACIONAL			
	H/ Primaria Incompleta	Prim. Completa H/ Secund. Inc.	Secundaria Completa y +	Total
Sí	18%	38%	45%	38%
No	82%	62%	55%	63%
Total	100%	100%	100%	100%
N	44	152	95	291

Base: encuestados que tuvieron relaciones sexuales el último año y se acuerdan de si usaron o no preservativos la primera vez

$p < 0,01$

Uso preservativos la primera relación sexual vez según nivel ocupacional

	NIVEL OCUPACIONAL				Total
	No Manual	Manual Alto	Manual Bajo	No Ocupado	
Sí	38%	32%	33%	47%	38%
No	62%	68%	67%	53%	63%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
<i>N</i>	63	62	93	73	291

Base: encuestados que tuvieron relaciones sexuales el último año y se acuerdan de si usaron o no preservativos la primera vez

No significativo

Uso preservativos la primera relación sexual según ingreso per capita del hogar

	TRAMOS DE INGRESO PER CAPITA DEL HOGAR				Total
	Menos de \$160	\$160 a \$399	\$400 y más	Sin esp / sin ing.	
Sí	38%	33%	40%	53%	38%
No	63%	67%	60%	47%	63%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
<i>N</i>	96	105	73	17	291

Base: encuestados que tuvieron relaciones sexuales el último año y se acuerdan de si usaron o no preservativos la primera vez

No significativo

USO DE PRESERVATIVO EN LA ÚLTIMA RELACIÓN SEXUAL CON PAREJAS ESTABLES

Uso de preservativo en la última relación sexual según zona

	ZONA		Total
	CAPITAL	GBA	
Sí	35%	26%	29%
No	65%	74%	71%
Total	100%	100%	100%
<i>N</i>	81	198	279

Base: personas que tuvieron relaciones sexuales el último año con parejas estables

Uso de preservativo en la última relación sexual según sexo

	SEXO		Total
	Masculino	Femenino	
Sí	28%	30%	29%
No	72%	71%	71%
Total	100%	100%	100%
<i>N</i>	140	139	279

Base: personas que tuvieron relaciones sexuales el último año con parejas estables

Uso de preservativo en la última relación sexual según grupo de edad

	GRUPO DE EDAD			Total
	15-24	25-44	45-64	
Sí	62%	28%	10%	29%
No	38%	72%	90%	71%
Total	100%	100%	100%	100%
<i>N</i>	60	117	102	279

Base: personas que tuvieron relaciones sexuales el último año con parejas estables

p<0,001

Uso de preservativo en la última relación sexual según nivel educacional

	NIVEL EDUCACIONAL			Total
	H/ Primaria Incompleta	Prim. Completa H/ Secund. Inc.	Secundaria Completa y +	
Sí	5%	30%	38%	29%
No	95%	70%	62%	71%
Total	100%	100%	100%	100%
<i>N</i>	43	143	93	279

Base: personas que tuvieron relaciones sexuales el último año con parejas estables
p<0,001

Uso de preservativo en la última relación sexual según nivel ocupacional

	NIVEL OCUPACIONAL				Total
	No Manual	Manual Alto	Manual Bajo	No Ocupado	
Sí	27%	26%	30%	31%	29%
No	73%	74%	71%	69%	71%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
<i>N</i>	59	57	88	75	279

Base: personas que tuvieron relaciones sexuales el último año con parejas estables

Uso de preservativo en la última relación sexual según ingreso per capita del hogar

	TRAMOS DE INGRESO PER CAPITA DEL HOGAR				Total
	Menos de \$160	\$160 a \$399	\$400 y más	Sin esp / sin ing.	
Sí	27%	28%	29%	41%	29%
No	73%	72%	71%	59%	71%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
<i>N</i>	89	107	66	17	279

Base: personas que tuvieron relaciones sexuales el último año con parejas estables

USO DE PRESERVATIVO EN LA ÚLTIMA RELACIÓN SEXUAL CON PAREJAS OCASIONALES

Uso de preservativo en la última relación sexual según zona

	ZONA		Total
	CAPITAL	GBA	
Sí	68%	73%	71%
No	32%	27%	29%
Total	100%	100%	100%
<i>N</i>	22	48	70

Base: personas que tuvieron relaciones sexuales el último año con parejas ocasionales
No significativo

Uso de preservativo en la última relación sexual según sexo

	SEXO		Total
	Masculino	Femenino	
Sí	71%	75%	71%
No	29%	25%	29%
Total	100%	100%	100%
<i>N</i>	62	8	70

Base: personas que tuvieron relaciones sexuales el último año con parejas ocasionales
No significativo

Uso de preservativo en la última relación sexual según grupo de edad

	GRUPO DE EDAD			
	15-24	25-44	45-64	Total
Sí	86%	81%	31%	71%
No	14%	19%	69%	29%
Total	100%	100%	100%	100%
<i>N</i>	28	26	16	70

Base: personas que tuvieron relaciones sexuales el último año con parejas ocasionales
p<0,001

Uso de preservativo en la última relación sexual según nivel educacional

	NIVEL EDUCACIONAL			
	H/ Primaria Incompleta	Prim. Completa H/ Secund. Inc.	Secundaria Completa y +	Total
Sí	40%	73%	76%	71%
No	60%	27%	24%	29%
Total	100%	100%	100%	100%
<i>N</i>	5	44	21	70

Base: personas que tuvieron relaciones sexuales el último año con parejas ocasionales
No significativo

Uso de preservativo en la última relación sexual según nivel ocupacional

	NIVEL OCUPACIONAL				Total
	No Manual	Manual Alto	Manual Bajo	No Ocupado	
Sí	63%	79%	67%	83%	71%
No	38%	21%	33%	17%	29%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
<i>N</i>	16	24	24	6	70

Base: personas que tuvieron relaciones sexuales el último año con parejas ocasionales
No significativo

Uso de preservativo en la última relación sexual según ingreso per capita del hogar

	TRAMOS DE INGRESO PER CAPITA DEL HOGAR				Total
	Menos de \$160	\$160 a \$399	\$400 y más	Sin esp / sin ing.	
Sí	70%	83%	64%	75%	71%
No	30%	17%	36%	25%	29%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
<i>N</i>	23	18	25	4	70

Base: personas que tuvieron relaciones sexuales el último año con parejas ocasionales
No significativo

FRECUENCIA DE USO DE PRESERVATIVO EN EL ÚLTIMO AÑO CON PAREJAS ESTABLES

Frecuencia de uso de preservativo según zona

	ZONA		Total
	CAPITAL	GBA	
Toda las veces	21%	14%	16%
Casi siempre	16%	9%	11%
A veces	12%	17%	15%
Nunca	51%	60%	58%
Total	100%	100%	100%
<i>N</i>	76	197	273

No significativo

Frecuencia de uso de preservativo según sexo

	SEXO		
	Masculino	Femenino	Total
Toda las veces	14%	18%	16%
Casi siempre	12%	10%	11%
A veces	16%	15%	15%
Nunca	58%	57%	58%
Total	100%	100%	100%
<i>N</i>	137	136	273

No significativo

Frecuencia de uso de preservativo según grupo de edad

	GRUPO DE EDAD			
	15-24	25-44	45-64	Total
Toda las veces	36%	15%	6%	16%
Casi siempre	21%	14%	2%	11%
A veces	16%	19%	11%	15%
Nunca	27%	52%	81%	58%
Total	100%	100%	100%	100%
<i>N</i>	56	117	100	273

$p < 0,001$

Frecuencia de uso de preservativo según nivel educacional

	NIVEL EDUCACIONAL				Total
	H/ Primaria Incompleta	Prim. Completa H/ Secund. Inc.	Secundaria Completa y +		
Toda las veces	2%	15%	24%	16%	
Casi siempre	5%	14%	10%	11%	
A veces	5%	18%	17%	15%	
Nunca	88%	54%	49%	58%	
Total	100%	100%	100%	100%	
<i>N</i>	43	140	90	273	

$p < 0,001$

Frecuencia de uso de preservativo según nivel ocupacional

	NIVEL OCUPACIONAL				Total
	No Manual	Manual Alto	Manual Bajo	No Ocupado	
Toda las veces	21%	13%	16%	15%	16%
Casi siempre	11%	9%	12%	12%	11%
A veces	7%	20%	20%	14%	15%
Nunca	61%	59%	53%	59%	58%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
<i>N</i>	57	56	87	73	273

No significativo

Frecuencia de uso de preservativo según ingreso per capita del hogar

	TRAMOS DE INGRESO PER CAPITA DEL HOGAR				Total
	Menos de \$160	\$160 a \$399	\$400 y más	Sin esp / sin ing.	
Toda las veces	14%	16%	19%	23%	16%
Casi siempre	11%	11%	9%	15%	11%
A veces	18%	12%	19%	8%	15%
Nunca	57%	60%	54%	54%	58%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
N	89	106	65	13	273

No significativo

FRECUENCIA DE USO DE PRESERVATIVO EN EL ÚLTIMO AÑO CON PAREJAS OCASIONALES

Frecuencia de uso de preservativo según zona

	ZONA		Total
	CAPITAL	GBA	
Toda las veces	59%	63%	61%
Casi siempre	9%	13%	11%
A veces	14%	13%	13%
Nunca	18%	13%	14%
Total	100%	100%	100%
N	22	48	70

No significativo

Frecuencia de uso de preservativo según sexo

	SEXO		Total
	Masculino	Femenino	
Toda las veces	63%	50%	61%
Casi siempre	10%	25%	11%
A veces	13%	13%	13%
Nunca	15%	13%	14%
Total	100%	100%	100%
N	62	8	70

No significativo

Frecuencia de uso de preservativo según grupo de edad

	GRUPO DE EDAD			Total
	15-24	25-44	45-64	
Toda las veces	79%	62%	31%	61%
Casi siempre	11%	19%	0%	11%
A veces	7%	8%	31%	13%
Nunca	4%	12%	38%	14%
Total	100%	100%	100%	100%
N	28	26	16	70

p<0,001

Frecuencia de uso de preservativo según nivel educacional

	NIVEL EDUCACIONAL			Total
	H/ Primaria Incompleta	Prim. Completa H/ Secund. Inc.	Secundaria Completa y +	
Toda las veces	40%	59%	71%	61%
Casi siempre	0%	16%	5%	11%
A veces	20%	11%	14%	13%
Nunca	40%	14%	10%	14%
Total	100%	100%	100%	100%
<i>N</i>	5	44	21	70

$p < 0,001$

Frecuencia de uso de preservativo según nivel ocupacional

	NIVEL OCUPACIONAL				Total
	No Manual	Manual Alto	Manual Bajo	No Ocupado	
Toda las veces	56%	71%	54%	67%	61%
Casi siempre	6%	8%	17%	17%	11%
A veces	19%	8%	13%	17%	13%
Nunca	19%	13%	17%	0%	14%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
<i>N</i>	16	24	24	6	70

No significativo

Frecuencia de uso de preservativo según ingreso per capita del hogar

	TRAMOS DE INGRESO PER CAPITA DEL HOGAR				Total
	Menos de \$160	\$160 a \$399	\$400 y más	Sin esp / sin ing.	
Toda las veces	52%	72%	64%	50%	61%
Casi siempre	17%	11%	4%	25%	11%
A veces	17%	6%	16%	0%	13%
Nunca	13%	11%	16%	25%	14%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
<i>N</i>	23	18	25	4	70

No significativo

SUGERENCIA DE USO PRESERVATIVO EN LA PAREJA ESTABLE

Quién sugirió el uso del preservativo la última vez en la pareja según zona

	ZONA		Total
	CAPITAL	GBA	
Encuestado	11%	27%	21%
Su pareja	0%	10%	6%
Ambos	89%	64%	73%
Total	100%	100%	100%
<i>N</i>	28	52	80

Base: personas que tuvieron relaciones sexuales en el último año con una pareja estable y usaron preservativo.

Quién sugirió el uso del preservativo la última vez en la pareja según sexo

	SEXO		Total
	Masculino	Femenino	
Encuestado	31%	12%	21%
Su pareja	3%	10%	6%
Ambos	67%	78%	73%
Total	100%	100%	100%
<i>N</i>	39	41	80

Base: personas que tuvieron relaciones sexuales en el último año con una pareja estable y usaron preservativo.

Quién sugirió el uso del preservativo la última vez en la pareja según edad

	GRUPO DE EDAD		Total
	15-24	25-64	
Encuestado	30%	14%	21%
Su pareja	3%	9%	6%
Ambos	68%	77%	73%
Total	100%	100%	100%
<i>N</i>	37	63	80

Base: personas que tuvieron relaciones sexuales en el último año con una pareja estable y usaron preservativo.

Quién sugirió el uso del preservativo la última vez en la pareja según nivel educacional

	NIVEL EDUCACIONAL		Total
	H/ Secundaria Incompleta	Secundaria Completa y +	
Encuestado	24%	17%	21%
Su pareja	11%	0%	6%
Ambos	64%	83%	73%
Total	100%	100%	100%
<i>N</i>	45	35	80

Base: personas que tuvieron relaciones sexuales en el último año con una pareja estable y usaron preservativo.

Quién sugirió el uso del preservativo la última vez en la pareja según nivel ocupacional

	NIVEL OCUPACIONAL		Total
	No Manual y Manual Calificado	Manual No Calificado y Sin Ocupación	
Encuestado	19%	23%	21%
Su pareja	3%	8%	6%
Ambos	78%	69%	73%
Total	100%	100%	100%
<i>N</i>	31	49	80

Base: personas que tuvieron relaciones sexuales en el último año con una pareja estable y usaron preservativo.

Quién sugirió el uso del preservativo la última vez en la pareja según ingreso per capita del hogar

	TRAMOS DE INGRESO PER CAPITA DEL HOGAR			
	Menos de \$160	\$160 y más	Sin esp / sin ing.	Total
Encuestado	29%	20%	0%	21%
Su pareja	17%	2%	0%	6%
Ambos	54%	78%	100%	73%
Total	100%	100%	100%	100%
<i>N</i>	24	49	7	80

Base: personas que tuvieron relaciones sexuales en el último año con una pareja estable y usaron preservativo.

SUGERENCIA DE USO PRESERVATIVO EN LA PAREJA OCASIONAL

Quién sugirió el uso del preservativo la última vez en la pareja según zona

	ZONA		
	CAPITAL	GBA	Total
Encuestado	40%	51%	48%
Su pareja	0%	20%	14%
Ambos	60%	29%	38%
Total	100%	100%	100%
<i>N</i>	15	35	50

Base: personas que tuvieron relaciones sexuales en el último año con una pareja ocasional y usaron preservativo.

Quién sugirió el uso del preservativo la última vez en la pareja según sexo

	SEXO		
	Masculino	Femenino	Total
Encuestado	50%	33%	48%
Su pareja	11%	33%	14%
Ambos	39%	33%	38%
Total	100%	100%	100%
<i>N</i>	44	6	50

Base: personas que tuvieron relaciones sexuales en el último año con una pareja ocasional y usaron preservativo.

Quién sugirió el uso del preservativo la última vez en la pareja según grupo de edad

	GRUPO DE EDAD		
	15-24	25-64	Total
Encuestado	42%	54%	48%
Su pareja	12%	15%	14%
Ambos	46%	31%	38%
Total	100%	100%	100%
<i>N</i>	24	26	50

Base: personas que tuvieron relaciones sexuales en el último año con una pareja ocasional y usaron preservativo.

Quién sugirió el uso del preservativo la última vez en la pareja según nivel educacional

	NIVEL EDUCACIONAL		
	H/ Secundaria Incompleta	Secundaria Completa y +	Total
Encuestado	59%	25%	48%
Su pareja	21%	0%	14%
Ambos	21%	75%	38%
Total	100%	100%	100%
<i>N</i>	34	16	50

Base: personas que tuvieron relaciones sexuales en el último año con una pareja ocasional y usaron preservativo.

Quién sugirió el uso del preservativo la última vez en la pareja según nivel ocupacional

	NIVEL OCUPACIONAL		
	No Manual y Manual Calificado	Manual No Calificado y Sin Ocupación	Total
Encuestado	48%	48%	48%
Su pareja	21%	5%	14%
Ambos	31%	48%	38%
Total	100%	100%	100
<i>N</i>	29	21	50

Base: personas que tuvieron relaciones sexuales en el último año con una pareja ocasional y usaron preservativo.

Quién sugirió el uso del preservativo la última vez en la pareja según ingreso per capita del hogar

	TRAMOS DE INGRESO PER CAPITA DEL HOGAR		
	Menos de \$160 a \$399	\$400 o más	Total
Encuestado	48%	50%	49%
Su pareja	16%	12%	15%
Ambos	36%	38%	36%
Total	100%	100%	100%
<i>N</i>	31	16	47

Base: personas que tuvieron relaciones sexuales en el último año con una pareja ocasional y usaron preservativo, sin tener en cuenta las personas sin ingresos

PERSONAS QUE ADOPTARON ALGUNA MEDIDA ANTICONCEPTIVA EN LA ÚLTIMA RELACIÓN CON PAREJA ESTABLE PARA EVITAR EL EMBARAZO

Personas que adoptaron alguna medida anticonceptiva para evitar el embarazo según zona

	ZONA		Total
	CAPITAL	GBA	
Sí	59%	57%	58%
No porque estaba embarazada	3%	2%	2%
No porque quería embarazarme	4%	5%	5%
No por otra razón	35%	36%	36%
Total	100%	100%	100%
<i>N</i>	81	97	278

Base: encuestados con parejas estables con relaciones sexuales en el último año
No significativo

Personas que adoptaron alguna medida anticonceptiva para evitar el embarazo según sexo

	SEXO		
	Masculino	Femenino	Total
Sí	61%	55%	58%
No porque estaba embarazada	3%	1%	2%
No porque quería embarazarme	4%	6%	5%
No por otra razón	32%	39%	36%
Total	100%	100%	100%
N	139	139	278

Base: encuestados con parejas estables con relaciones sexuales en el último año
No significativo

Personas que adoptaron alguna medida anticonceptiva para evitar el embarazo según grupo de edad

	GRUPO DE EDAD			
	15-24	25-44	45-64	Total
Sí	83%	70%	29%	58%
No porque estaba embarazada	3%	3%	0%	2%
No porque quería embarazarme	2%	8%	3%	5%
No por otra razón	12%	20%	68%	36%
Total	100%	100%	100%	100%
N	60	116	102	278

Base: encuestados con parejas estables con relaciones sexuales en el último año
p<0,001

Personas que adoptaron alguna medida anticonceptiva para evitar el embarazo según nivel educacional

	NIVEL EDUCACIONAL			Total
	H/ Primaria Incompleta	Prim. Completa H/ Secund. Inc.	Secundaria Completa y +	
Sí	37%	60%	65%	58%
No porque estaba embarazada	0%	2%	2%	2%
No porque quería embarazarme	2%	6%	4%	5%
No por otra razón	61%	32%	29%	36%
Total	100%	100%	100%	100%
N	43	42	193	278

Base: encuestados con parejas estables con relaciones sexuales en el último año

$p < 0,05$

Personas que adoptaron alguna medida anticonceptiva para evitar el embarazo según nivel ocupacional

	NIVEL OCUPACIONAL				Total
	No Manual	Manual Alto	Manual Bajo	No Ocupado	
Sí	56%	61%	59%	56%	58%
No porque estaba embarazada	0%	4%	3%	0%	2%
No porque quería embarazarme	5%	2%	6%	5%	5%
No por otra razón	39%	34%	32%	39%	36%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
N	59	56	88	75	278

Base: encuestados con parejas estables con relaciones sexuales en el último año
No significativo

Personas que adoptaron alguna medida anticonceptiva para evitar el embarazo según ingreso per capita del hogar

	TRAMOS DE INGRESO PER CAPITA DEL HOGAR				Total
	Menos de \$160	\$160 a \$399	\$400 y más	Sin esp / sin ing.	
Sí	62%	57%	55%	53%	58%
No porque estaba embarazada	0%	4%	2%	0%	2%
No porque quería embarazarme	5%	5%	6%	0%	5%
No por otra razón	34%	35%	37%	47%	36%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
N	89	107	65	17	278

Base: encuestados con parejas estables con relaciones sexuales en el último año
No significativo

PERSONAS QUE ADOPTARON ALGUNA MEDIDA ANTICONCEPTIVA EN LA ÚLTIMA RELACIÓN CON PAREJA OCASIONAL PARA EVITAR EL EMBARAZO

Personas que adoptaron alguna medida anticonceptiva para evitar el embarazo según zona

	ZONA		Total
	CAPITAL	GBA	
Sí	85%	83%	84%
No	15%	17%	16%
Total	100%	100%	100%
N	20	48	68

Base: encuestados con parejas ocasionales con relaciones sexuales en el último año

No significativo

Personas que adoptaron alguna medida anticonceptiva para evitar el embarazo según sexo

	SEXO		
	Masculino	Femenino	Total
Sí	87%	63%	84%
No	13%	38%	16%
Total	100%	100%	100%
N	60	8	68

Base: encuestados con parejas ocasionales con relaciones sexuales en el último año

No significativo

Personas que adoptaron alguna medida anticonceptiva para evitar el embarazo según grupo de edad

	GRUPO DE EDAD			
	15-24	25-44	45-64	Total
Sí	86%	84%	80%	84%
No por otra razón	14%	16%	20%	16%
Total	100%	100%	100%	100%
N	28	25	15	68

Base: encuestados con parejas ocasionales con relaciones sexuales en el último año

No significativo

Personas que adoptaron alguna medida anticonceptiva para evitar el embarazo según nivel educacional

	NIVEL EDUCACIONAL			
	H/ Primaria Incompleta	Prim. Completa H/ Secund. Inc.	Secundaria Completa y +	Total
Sí	80%	86%	81%	84%
No	20%	14%	19%	16%
Total	100%	100%	100%	100%
N	5	42	21	68

Base: encuestados con parejas ocasionales con relaciones sexuales en el último año

No significativo

Personas que adoptaron alguna medida anticonceptiva para evitar el embarazo según nivel ocupacional

	NIVEL OCUPACIONAL				
	No Manual	Manual Alto	Manual Bajo	No Ocupado	Total
Sí	88%	83%	83%	83%	84%
No	13%	17%	17%	17%	16%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
N	16	23	23	6	68

Base: encuestados con parejas ocasionales con relaciones sexuales en el último año

No significativo

Personas que adoptaron alguna medida anticonceptiva para evitar el embarazo según ingreso per capita del hogar

TRAMOS DE INGRESO PER CAPITA DEL HOGAR					
	Menos de \$160	\$160 a \$399	\$400 y más	Sin esp / sin ing.	Total
Sí	78%	89%	83%	100%	84%
No	22%	11%	17%	0%	16%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
<i>N</i>	23	18	24	3	68

Base: encuestados con parejas ocasionales con relaciones sexuales en el último año
No significativo

Cuadros correspondientes al capítulo 5 Conductas de prevención en relación con el VIH

PERSONAS QUE HICIERON ALGO PARA EVITAR CONTRAER EL SIDA DESDE QUE ESCUCHAR HABLAR DE LA ENFERMEDAD

Personas que hicieron algo para evitar contraer el sida desde que escuchar hablar de la enfermedad según zona

	ZONA		
	CAPITAL	GBA	Total
Sí	69%	62%	64%
No	31%	38%	36%
Total	100%	100%	100%
<i>N</i>	101	250	351

No significativo

Personas que hicieron algo para evitar contraer el sida desde que escuchar hablar de la enfermedad según zona

	SEXO		
	Masculino	Femenino	Total
Sí	70%	58%	64%
No	30%	42%	36%
Total	100%	100%	100%
<i>N</i>	178	173	351

$p < 0,05$

Personas que hicieron algo para evitar contraer el sida desde que escuchar hablar de la enfermedad según zona

	GRUPO DE EDAD			
	15-24	25-44	45-64	Total
Sí	71%	78%	47%	64%
No	29%	22%	53%	36%
Total	100%	100%	100%	100%
<i>N</i>	80	129	142	351

$p < 0,001$

Personas que hicieron algo para evitar contraer el sida desde que escuchar hablar de la enfermedad según nivel educacional

	NIVEL EDUCACIONAL			Total
	H/ Primaria Incompleta	Prim. Completa H/ Secund. Inc.	Secundaria Completa y +	
Sí	41%	62%	81%	64%
No	59%	38%	19%	36%

Total	100%	100%	100%	100%
<i>N</i>	58	188	105	351
<i>p</i> <0,001				

Personas que hicieron algo para evitar contraer el sida desde que escuchar hablar de la enfermedad según nivel ocupacional

	NIVEL OCUPACIONAL				Total
	No Manual	Manual Alto	Manual Bajo	No Ocupado	
Sí	74%	74%	62%	52%	64%
No	26%	26%	38%	48%	36%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
<i>N</i>	72	70	115	94	351
<i>p</i> <0,05					

Personas que hicieron algo para evitar contraer el sida desde que escuchar hablar de la enfermedad según ingreso per capita del hogar

	TRAMOS DE INGRESO PER CAPITA DEL HOGAR				Total
	Menos de \$160	\$160 a \$399	\$400 y más	Sin esp / sin ing.	
Sí	58%	62%	74%	72%	64%
No	42%	38%	26%	28%	36%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
<i>N</i>	122	123	81	25	351
<i>p</i> <0,10					

Cuadros correspondientes al capítulo 6 *Accesibilidad al sistema de salud*

ACCESIBILIDAD A LOS SISTEMAS DE SALUD

Cobertura de salud las personas según zona

	ZONA		
	CAPITAL	GBA	Total
Posee	63%	43%	49%
No posee	37%	57%	51%
Total	100%	100%	100%
N	102	248	350

$p < 0,001$

Nota: hay 4 casos que No sabe

Cobertura de salud las personas según sexo

	SEXO		
	Masculino	Femenino	Total
Posee	49%	49%	49%
No posee	51%	51%	51%
Total	100%	100%	100%
N	176	174	350

No significativo

Cobertura de salud según grupos de edad

	GRUPO DE EDAD			
	15-24	25-44	45-64	Total
Posee	52%	44%	51%	49%
No posee	48%	56%	49%	51%
Total	100%	100%	100%	100%
N	80	128	142	350

No significativo

Cobertura de salud según nivel educacional

	NIVEL EDUCACIONAL			Total
	H/ Primaria Incompleta	Prim. Completa H/ Secund. Inc.	Secundaria Completa y +	
Posee	36%	43%	66%	49%
No posee	64%	57%	34%	51%
Total	100%	100%	100%	100%
N	55	190	105	350

$p < 0,01$

Cobertura de salud según nivel ocupacional

NIVEL OCUPACIONAL

	No Manual	Manual Alto	Manual Bajo	No Ocupado	Total
Posee	69%	39%	44%	47%	49%
No posee	31%	61%	56%	53%	51%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
N	71	70	114	95	350

$p < 0,05$

Cobertura de salud según ingreso per capita del hogar

TRAMOS DE INGRESO PER CAPITA DEL HOGAR

	Menos de \$160	\$160 a \$399	\$400 y más	Sin esp / sin ing.	Total
Posee	25%	60%	60%	72%	49%
No posee	75%	40%	40%	28%	51%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
N	122	123	80	25	350

$p < 0,001$

PERSONAS QUE REALIZARON LA PRUEBA DEL VIH

Personas que realizaron la prueba del VIH según zona

	ZONA		Total
	CAPITAL	GBA	
Sí	46%	52%	50%
No	54%	46%	49%
NS/NC	0%	2%	1%
Total	100%	100%	100%
N	102	252	354

No significativo

Personas que realizaron la prueba del VIH según sexo

	SEXO		Total
	Masculino	Femenino	
Sí	45%	56%	50%
No	54%	43%	49%
NS/NC	1%	1%	1%
Total	100%	100%	100%
N	178	176	354

No significativo

Personas que realizaron la prueba del VIH según grupo de edad

	GRUPO DE EDAD			Total
	15-24	25-44	45-64	
Sí	33%	65%	47%	50%
No	67%	35%	50%	49%
NS/NC	0%	0%	3%	1%
Total	100%	100%	100%	100%
N	81	130	143	354

$p < 0,001$

Personas que realizaron la prueba del VIH según nivel educacional

	NIVEL EDUCACIONAL			Total
	H/ Primaria Incompleta	Prim. Completa H/ Secund. Inc.	Secundaria Completa y +	
Sí	45%	51%	51%	50%
No	52%	48%	48%	49%
NS/NC	3%	1%	1%	1%
Total	100%	100%	100%	100%
<i>N</i>	58	191	105	354

No significativo

Personas que realizaron la prueba del VIH según nivel ocupacional

	NIVEL OCUPACIONAL				Total
	No Manual	Manual Alto	Manual Bajo	No Ocupado	
Sí	57%	51%	41%	56%	50%
No	40%	49%	59%	43%	49%
NS/NC	3%	0%	1%	1%	1%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
<i>N</i>	72	70	116	96	354

No significativo

Personas que realizaron la prueba del VIH según ingreso per capita del hogar

	TRAMOS DE INGRESO PER CAPITA DEL HOGAR				Total
	Menos de \$160	\$160 a \$399	\$400 y más	Sin esp / sin ing.	
Sí	47%	53%	49%	56%	50%
No	52%	47%	48%	44%	49%
NS/NC	2%	0%	3%	0%	1%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
<i>N</i>	124	124	81	25	354

No significativo

PERSONAS QUE REALIZARON LA PRUEBA DEL VIH EL ÚLTIMO AÑO

Personas que realizaron la prueba del VIH el último año según zona

	ZONA		Total
	CAPITAL	GBA	
Sí	40%	36%	37%
No	60%	64%	63%
Total	100%	100%	100%
<i>N</i>	47	131	178

No significativo

Personas que realizaron la prueba del VIH el último año según sexo

	SEXO		Total
	Masculino	Femenino	
Sí	29%	44%	37%
No	71%	56%	63%
Total	100%	100%	100%
<i>N</i>	80	98	178

p < 0,01

Personas que realizaron la prueba del VIH el último año según grupo de edad

	GRUPO DE EDAD			
	15-24	25-44	45-64	Total
Sí	44%	44%	25%	37%
No	56%	56%	75%	63%
Total	100%	100%	100%	100%
N	27	84	67	178

$p < 0,05$

Personas que realizaron la prueba del VIH el último año según nivel educacional

	NIVEL EDUCACIONAL			
	H/ Primaria Incompleta	Prim. Completa H/ Secund. Inc.	Secundaria Completa y +	Total
Sí	27%	38%	41%	37%
No	73%	62%	59%	63%
Total	100%	100%	100%	100%
N	26	98	54	178

No significativo

Personas que realizaron la prueba del VIH el último año según nivel ocupacional

	NIVEL OCUPACIONAL				
	No Manual	Manual Alto	Manual Bajo	No Ocupado	Total
Sí	37%	28%	36%	44%	37%
No	63%	72%	64%	56%	63%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
N	41	36	47	54	178

No significativo

Personas que realizaron la prueba del VIH el último año según ingreso per capita del hogar

	TRAMOS DE INGRESO PER CAPITA DEL HOGAR				
	Menos de \$160	\$160 a \$399	\$400 y más	Sin esp / sin ing.	Total
Sí	40%	36%	38%	29%	37%
No	60%	64%	63%	71%	63%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
N	58	66	40	14	178

No significativo

CONOCIMIENTO DE LUGAR DONDE REALIZAR LA PRUEBA DEL VIH, DE LOS QUE QUIEREN REALIZÁRSELA

Conocimiento de lugar donde realizar la prueba del VIH, de los que quieren realizársela según zona

	ZONA		Total
	CAPITAL	GBA	
Sí	81%	80%	81%
No	17%	19%	18%
NS/NC	1%	1%	1%
Total	100%	100%	100%
N	75	189	264

No significativo

Conocimiento de lugar donde realizar la prueba del VIH, de los que quieren realizársela según sexo

	SEXO			Total
	Masculino	Femenino		
Sí	79%	82%		81%
No	19%	18%		18%
NS/NC	2%	0%		1%
Total	100%	100%		100%
N	130	134		264

No significativo

Conocimiento de lugar donde realizar la prueba del VIH, de los que quieren realizársela según grupo de edad

	GRUPO DE EDAD				Total
	15-24	25-44	45-64		
Sí	73%	90%	76%		81%
No	27%	9%	22%		18%
NS/NC	0%	1%	2%		1%
Total	100%	100%	100%		100%
N	62	108	94		264

$p < 0,05$

Conocimiento de lugar donde realizar la prueba del VIH, de los que quieren realizársela según nivel educacional

	NIVEL EDUCACIONAL				Total
	H/ Primaria Incompleta	Prim. Completa H/ Secund. Inc.	Secundaria Completa y +		
Sí	74%	79%	88%		81%
No	21%	21%	12%		18%
NS/NC	5%	1%	0%		1%
Total	100%	100%	100%		100%
N	39	144	81		264

$p < 0,05$

Conocimiento de lugar donde realizar la prueba del VIH, de los que quieren realizársela según nivel ocupacional

	NIVEL OCUPACIONAL				Total
	No Manual	Manual Alto	Manual Bajo	No Ocupado	
Sí	82%	84%	74%	85%	81%
No	19%	11%	26%	16%	18%
NS/NC	0%	5%	0%	0%	1%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
N	54	57	82	71	264

$p < 0,05$

Conocimiento de lugar donde realizar la prueba del VIH, de los que quieren realizársela según ingreso per capita del hogar

	TRAMOS DE INGRESO PER CAPITA DEL HOGAR				Total
	Menos de \$160	\$160 a \$399	\$400 y más	Sin esp / sin ing.	
Sí	75%	85%	81%	88%	81%

No	23%	15%	17%	13%	18%
NS/NC	2%	0%	2%	0%	1%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
<i>N</i>	93	91	64	16	264

No significativo

CONOCIMIENTO DE UN LUGAR DONDE RECIBIR ATENCIÓN ANTE UN RESULTADO POSITIVO DE LA PRUEBA DEL VIH

Conocimiento de un lugar donde recibir atención ante un resultado positivo de la prueba del VIH según zona

	ZONA		
	CAPITAL	GBA	Total
Sí	52%	38%	42%
No	48%	62%	58%
Total	100%	100%	100%
<i>N</i>	102	252	354

p < 0,05

Conocimiento de un lugar donde recibir atención ante un resultado positivo de la prueba del VIH según sexo

	SEXO		
	Masculino	Femenino	Total
Sí	43%	42%	42%
No	57%	59%	58%
Total	100%	100%	100%
<i>N</i>	178	176	354

No significativo

Conocimiento de un lugar donde recibir atención ante un resultado positivo de la prueba del VIH según grupo de edad

	GRUPO DE EDAD			
	15-24	25-44	45-64	Total
Sí	32%	48%	43%	42%
No	68%	52%	57%	58%
Total	100%	100%	100%	100%
<i>N</i>	81	130	143	354

p < 0,10

Conocimiento de un lugar donde recibir atención ante un resultado positivo de la prueba del VIH según nivel educacional

	NIVEL EDUCACIONAL			
	H/ Primaria Incompleta	Prim. Completa H/ Secund. Inc.	Secundaria Completa y +	Total
Sí	21%	45%	50%	42%
No	79%	56%	51%	58%
Total	100%	100%	100%	100%

N 58 191 105 354
p < 0,001

Conocimiento de un lugar donde recibir atención ante un resultado positivo de la prueba del VIH según nivel ocupacional

NIVEL OCUPACIONAL					
	No Manual	Manual Alto	Manual Bajo	No Ocupado	Total
Sí	49%	41%	40%	41%	42%
No	51%	59%	60%	59%	58%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
<i>N</i>	72	70	116	96	354

No significativo

Conocimiento de un lugar donde recibir atención ante un resultado positivo de la prueba del VIH según ingreso per capita del hogar

TRAMOS DE INGRESO PER CAPITA DEL HOGAR					
	Menos de \$160	\$160 a \$399	\$400 y más	Sin esp / sin ing.	Total
Sí	38%	46%	41%	48%	42%
No	62%	54%	59%	52%	58%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
<i>N</i>	124	124	81	25	354

No significativo

Cuadros correspondientes al capítulo 7 Actitudes de discriminación con respecto al VIH/SIDA

“EL VIH-SIDA EN ARGENTINA ES UN PROBLEMA...”

“El VIH-SIDA en Argentina es un problema...” según zona

	ZONA		
	CAPITAL	GBA	Total
Nada, Apenas, Grave	62%	58%	59%
Muy grave	38%	43%	41%
Total	100%	100%	100%
N	102	252	354

No significativo

“El VIH-SIDA en Argentina es un problema...” según sexo

	SEXO		
	Masculino	Femenino	Total
Nada, Apenas, Grave	62%	55%	59%
Muy grave	38%	45%	41%
Total	100%	100%	100%
N	178	176	354

No significativo

“El VIH-SIDA en Argentina es un problema...” según grupo de edad

	GRUPO DE EDAD			
	15-24	25-44	45-64	Total
Nada, Apenas, Grave	64%	54%	60%	59%
Muy grave	36%	46%	40%	41%
Total	100%	100%	100%	100%
N	81	130	143	354

No significativo

“El VIH-SIDA en Argentina es un problema...” según nivel educacional

	NIVEL EDUCACIONAL			
	H/ Primaria Incompleta	Prim. Completa H/ Secund. Inc.	Secundaria Completa y +	Total
Nada, Apenas, Grave	62%	59%	57%	59%
Muy grave	38%	41%	43%	41%

Total	100%	100%	100%	100%
N	58	191	105	354

No significativo

“El VIH-SIDA en Argentina es un problema...” según nivel ocupacional

	NIVEL OCUPACIONAL				Total
	No Manual	Manual Alto	Manual Bajo	No Ocupado	
Nada, Apenas, Grave	61%	51%	61%	59%	59%
Muy grave	39%	49%	39%	41%	41%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
N	72	70	116	96	354

No significativo

“El VIH-SIDA en Argentina es un problema...” según ingreso per capita del hogar

	TRAMOS DE INGRESO PER CAPITA DEL HOGAR				Total
	Menos de \$160	\$160 a \$399	\$400 y más	Sin esp / sin ing.	
Nada, Apenas, Grave	63%	52%	63%	56%	59%
Muy grave	37%	48%	37%	44%	41%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
N	124	124	81	25	354

No significativo

“¿CONOCE PERSONALMENTE A ALGUIEN QUE TIENE HIV O HA MUERTO DE SIDA?”

“¿Conoce personalmente a alguien que tiene HIV o ha muerto de SIDA?” según zona

	ZONA		
	CAPITAL	GBA	Total
Sí	51%	49%	50%
No	49%	51%	50%
Total	100%	100%	100%
N	102	252	354

No significativo

“¿Conoce personalmente a alguien que tiene HIV o ha muerto de SIDA?” según sexo

	SEXO		
	Masculino	Femenino	Total
Sí	51%	49%	50%
No	49%	51%	50%
Total	100%	100%	100%
N	178	176	354

No significativo

“¿Conoce personalmente a alguien que tiene HIV o ha muerto de SIDA?” según grupo de edad

	GRUPO DE EDAD			
	15-24	25-44	45-64	Total
Sí	47%	52%	49%	50%
No	53%	48%	51%	50%
Total	100%	100%	100%	100%
N	81	130	143	354

No significativo

“¿Conoce personalmente a alguien que tiene HIV o ha muerto de SIDA?” según nivel educacional

	NIVEL EDUACIONAL			Total
	H/ Primaria Incompleta	Prim. Completa H/ Secund. Inc.	Secundaria Completa y +	
Sí	43%	55%	44%	50%
No	57%	45%	56%	50%
Total	100%	100%	100%	100%
N	58	191	105	354

No significativo

“¿Conoce personalmente a alguien que tiene HIV o ha muerto de SIDA?” según nivel ocupacional

	NIVEL OCUPACIONAL				Total
	No Manual	Manual Alto	Manual Bajo	No Ocupado	
Sí	57%	49%	47%	48%	50%
No	43%	51%	53%	52%	50%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
N	72	70	116	96	354

No significativo

“¿Conoce personalmente a alguien que tiene HIV o ha muerto de SIDA?” según ingreso per capita del hogar

	TRAMOS DE INGRESO PER CAPITA DEL HOGAR				Total
	Menos de \$160	\$160 a \$399	\$400 y más	Sin esp / sin ing.	
Sí	50%	53%	48%	36%	50%
No	50%	47%	52%	64%	50%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
N	124	124	81	25	354

No significativo

“¿COMPARTIRÍA UNA COMIDA CON UNA PERSONAS QUE SABE O SOSPECHA QUE TIENE VIH O SIDA?”

“¿Compartiría una comida con una personas que sabe o sospecha que tiene VIH o SIDA?” según zona

	ZONA		Total
	CAPITAL	GBA	
Sí	83%	77%	79%
No	12%	16%	14%
NS/NC	5%	8%	7%
Total	100%	100%	100%
N	102	252	354

No significativo

“¿Compartiría una comida con una personas que sabe o sospecha que tiene VIH o SIDA?” según sexo

	SEXO		Total
	Masculino	Femenino	

Sí	79%	78%	79%
No	14%	15%	14%
NS/NC	7%	7%	7%
Total	100%	100%	100%
N	178	176	354

No significativo

“¿Compartiría una comida con una personas que sabe o sospecha que tiene VIH o SIDA?”
según grupo de edad

	GRUPO DE EDAD			
	15-24	25-44	45-64	Total
Sí	79%	86%	71%	79%
No	15%	9%	20%	14%
NS/NC	6%	5%	9%	7%
Total	100%	100%	100%	100%
N	81	130	143	354

$P < 0,10$

“¿Compartiría una comida con una personas que sabe o sospecha que tiene VIH o SIDA?”
según nivel educacional

	NIVEL EDUCACIONAL			
	H/ Primaria Incompleta	Prim. Completa H/ Secund. Inc.	Secundaria Completa y +	Total
Sí	57%	80%	89%	79%
No	28%	15%	7%	14%
NS/NC	16%	6%	5%	7%
Total	100%	100%	100%	100%
N	58	191	105	354

$P < 0,001$

“¿Compartiría una comida con una personas que sabe o sospecha que tiene VIH o SIDA?”
según nivel ocupacional

	NIVEL OCUPACIONAL				
	No Manual	Manual Alto	Manual Bajo	No Ocupado	Total
Sí	83%	81%	72%	81%	79%
No	6%	9%	24%	14%	14%
NS/NC	11%	10%	4%	5%	7%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
N	72	70	116	96	354

$P < 0,01$

“¿Compartiría una comida con una personas que sabe o sospecha que tiene VIH o SIDA?”
según ingreso per capita del hogar

	TRAMOS DE INGRESO PER CAPITA DEL HOGAR				
	Menos de \$160	\$160 a \$399	\$400 y más	Sin esp / sin ing.	Total
Sí	71%	85%	82%	76%	79%
No	23%	10%	11%	4%	14%
NS/NC	6%	6%	7%	20%	7%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
N	124	124	81	25	354

$P < 0,01$

“¿TOMARÍA DEL MISMO VASO QUE UNA PERSONAS QUE SABE O SOSPECHA QUE TIENE VIH O SIDA?”

“¿Tomaría del mismo vaso que una personas que sabe o sospecha que tiene VIH o SIDA?”
según zona

	ZONA		
	CAPITAL	GBA	Total
Sí	60%	59%	59%
No	28%	33%	31%
NS/NC	13%	8%	9%
Total	100%	100%	100%
N	102	252	354

No significativo

“¿Tomaría del mismo vaso que una personas que sabe o sospecha que tiene VIH o SIDA?”
según sexo

	SEXO		
	Masculino	Femenino	Total
Sí	58%	61%	59%
No	30%	32%	31%
NS/NC	12%	7%	9%
Total	100%	100%	100%
N	178	176	354

No significativo

“¿Tomaría del mismo vaso que una personas que sabe o sospecha que tiene VIH o SIDA?”
según grupo de edad

	GRUPO DE EDAD			
	15-24	25-44	45-64	Total
Sí	54%	67%	55%	59%
No	35%	25%	35%	31%
NS/NC	11%	8%	10%	9%
Total	100%	100%	100%	100%
N	81	130	143	354

No significativo

“¿Tomaría del mismo vaso que una personas que sabe o sospecha que tiene VIH o SIDA?”
según nivel educacional

	NIVEL EDUCACIONAL			
	H/ Primaria Incompleta	Prim. Completa H/ Secund. Inc.	Secundaria Completa y +	Total
Sí	45%	61%	64%	59%
No	43%	31%	26%	31%
NS/NC	12%	8%	11%	9%
Total	100%	100%	100%	100%
N	58	191	105	354

No significativo

“¿Tomaría del mismo vaso que una personas que sabe o sospecha que tiene VIH o SIDA?”
según nivel ocupacional

	NIVEL OCUPACIONAL			
	No Manual	Manual Alto	Manual Bajo	No Ocupado

Sí	67%	64%	49%	63%	59%
No	25%	24%	41%	29%	31%
NS/NC	8%	11%	10%	8%	9%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
N	72	70	116	96	354

No significativo

“¿Tomaría del mismo vaso que una personas que sabe o sospecha que tiene VIH o SIDA?”
según ingreso per capita del hogar

	TRAMOS DE INGRESO PER CAPITA DEL HOGAR				Total
	Menos de \$160	\$160 a \$399	\$400 y más	Sin esp / sin ing.	
Sí	58%	63%	57%	56%	59%
No	34%	30%	33%	20%	31%
NS/NC	8%	7%	10%	24%	9%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
N	124	124	81	25	354

No significativo

“SI UN MAESTRO TIENE SIDA ¿PIENSA QUE SE LE DEBERÍA PERMITIR SEGUIR ENSEÑANDO EN LA ESCUELA?”

“Si un maestro tiene SIDA ¿piensa que se le debería permitir seguir enseñando en la escuela?”
según zona

	ZONA		
	CAPITAL	GBA	Total
Sí	82%	73%	76%
No	9%	18%	15%
NS/NC	9%	9%	9%
Total	100%	100%	100%
N	102	252	354

P<0,10

“Si un maestro tiene SIDA ¿piensa que se le debería permitir seguir enseñando en la escuela?”
según sexo

	SEXO		Total
	Masculino	Femenino	
Sí	74%	78%	76%
No	18%	13%	15%
NS/NC	8%	10%	9%
Total	100%	100%	100%
N	178	176	354

No significativo

“Si un maestro tiene SIDA ¿piensa que se le debería permitir seguir enseñando en la escuela?”
según grupo de edad

	GRUPO DE EDAD			Total
	15-24	25-44	45-64	
Sí	73%	82%	71%	76%
No	19%	12%	17%	15%
NS/NC	9%	6%	12%	9%
Total	100%	100%	100%	100%
N	81	130	143	354

No significativo

“Si un maestro tiene SIDA ¿piensa que se le debería permitir seguir enseñando en la escuela?”
según nivel educacional

	NIVEL EDUACIONAL			Total
	H/ Primaria Incompleta	Prim. Completa H/ Secund. Inc.	Secundaria Completa y +	
Sí	57%	74%	89%	76%
No	31%	15%	8%	15%
NS/NC	12%	11%	4%	9%
Total	100%	100%	100%	100%
N	58	191	105	354

P<0,001

“Si un maestro tiene SIDA ¿piensa que se le debería permitir seguir enseñando en la escuela?”
según nivel ocupacional

	NIVEL OCUPACIONAL				Total
	No Manual	Manual Alto	Manual Bajo	No Ocupado	
Sí	88%	77%	70%	73%	76%
No	8%	16%	19%	16%	15%
NS/NC	4%	7%	11%	12%	9%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
N	72	70	116	96	354

No significativo

“Si un maestro tiene SIDA ¿piensa que se le debería permitir seguir enseñando en la escuela?”
según ingreso per capita del hogar

	TRAMOS DE INGRESO PER CAPITA DEL HOGAR				Total
	Menos de \$160	\$160 a \$399	\$400 y más	Sin esp / sin ing.	
Sí	69%	81%	82%	68%	76%
No	21%	11%	16%	4%	15%
NS/NC	11%	8%	3%	28%	9%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
N	124	124	81	25	354

P<0,001

“SI SE ENTERA QUE ALGUIEN QUE VENDE FRUTAS Y VERDURAS TIENE EL SIDA, ¿LE SEGUIRÍA COMPRANDO?”

“Si se entera que alguien que vende frutas y verduras tiene el SIDA, ¿le seguiría comprando?”
según zona

	ZONA		Total
	CAPITAL	GBA	
Sí	76%	70%	72%
No	19%	20%	20%
NS/NC	6%	10%	9%
Total	100%	100%	100%
N	102	252	354

P<0,10

“Si se entera que alguien que vende frutas y verduras tiene el SIDA, ¿le seguiría comprando?”
según sexo

	SEXO		
	Masculino	Femenino	Total
Sí	75%	68%	72%
No	19%	21%	20%
NS/NC	7%	11%	9%
Total	100%	100%	100%
N	178	176	354

No significativo

“Si se entera que alguien que vende frutas y verduras tiene el SIDA, ¿le seguiría comprando?”
según grupo de edad

	GRUPO DE EDAD			
	15-24	25-44	45-64	Total
Sí	61%	84%	66%	72%
No	31%	11%	22%	20%
NS/NC	9%	5%	12%	9%
Total	100%	100%	100%	100%
N	81	130	143	354

P<0,001

“Si se entera que alguien que vende frutas y verduras tiene el SIDA, ¿le seguiría comprando?”
según nivel educacional

	NIVEL EDUCACIONAL			
	H/ Primaria Incompleta	Prim. Completa H/ Secund. Inc.	H/ Secundaria Completa y +	Total
Sí	53%	71%	82%	72%
No	36%	19%	12%	20%
NS/NC	10%	10%	6%	9%
Total	100%	100%	100%	100%
N	58	191	105	354

P<0,01

“Si se entera que alguien que vende frutas y verduras tiene el SIDA, ¿le seguiría comprando?”
según nivel ocupacional

	NIVEL OCUPACIONAL				
	No Manual	Manual Alto	Manual Bajo	No Ocupado	Total
Sí	81%	76%	66%	68%	72%
No	13%	19%	24%	21%	20%
NS/NC	7%	6%	10%	12%	9%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
N	72	70	116	96	354

No significativo

“Si se entera que alguien que vende frutas y verduras tiene el SIDA, ¿le seguiría comprando?”
según ingreso per capita del hogar

	TRAMOS DE INGRESO PER CAPITA DEL HOGAR			
	Menos de \$160	\$160 a \$399	\$400 y más	Sin esp / sin

	\$160			ing.	
Sí	61%	77%	79%	68%	72%
No	31%	14%	16%	8%	20%
NS/NC	8%	9%	5%	24%	9%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
N	124	124	81	25	354

P<0,001

“SI UN MIEMBRO DE SU FAMILIA SE ENFERMARA DE SIDA, ¿QUERRÍA QUE LO MANTUVIERA EN SECRETO?”

“Si un miembro de su familia se enfermara de SIDA, ¿querría que lo mantuviera en secreto?”
según zona

	ZONA		
	CAPITAL	GBA	Total
Sí	10%	16%	14%
No	76%	72%	73%
NS/NC	15%	12%	13%
Total	100%	100%	100%
N	102	252	354

P<0,10

“Si un miembro de su familia se enfermara de SIDA, ¿querría que lo mantuviera en secreto?”
según sexo

	SEXO		
	Masculino	Femenino	Total
Sí	16%	13%	14%
No	70%	77%	73%
NS/NC	15%	11%	13%
Total	100%	100%	100%
N	178	176	354

No significativo

“Si un miembro de su familia se enfermara de SIDA, ¿querría que lo mantuviera en secreto?”
según grupo de edad

	GRUPO DE EDAD			
	15-24	25-44	45-64	Total
Sí	7%	13%	19%	14%
No	78%	75%	69%	73%
NS/NC	15%	12%	13%	13%
Total	100%	100%	100%	100%
N	81	130	143	354

No significativo

“Si un miembro de su familia se enfermara de SIDA, ¿querría que lo mantuviera en secreto?”
según nivel educacional

	NIVEL EDUACIONAL			Total
	H/ Primaria Incompleta	Prim. Completa H/ Secund. Inc.	Secundaria Completa y +	
Sí	14%	18%	8%	14%
No	74%	74%	71%	73%
NS/NC	12%	8%	21%	13%
Total	100%	100%	100%	100%
N	58	191	105	354

P<0,01

“Si un miembro de su familia se enfermara de SIDA, ¿querría que lo mantuviera en secreto?”
según nivel ocupacional

	NIVEL OCUPACIONAL				Total
	No Manual	Manual Alto	Manual Bajo	No Ocupado	
Sí	10%	11%	20%	13%	14%
No	69%	79%	69%	77%	73%
NS/NC	21%	10%	11%	10%	13%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
N	72	70	116	96	354

No significativo

“Si un miembro de su familia se enfermara de SIDA, ¿querría que lo mantuviera en secreto?”
según ingreso per capita del hogar

	TRAMOS DE INGRESO PER CAPITA DEL HOGAR				Total
	Menos de \$160	\$160 a \$399	\$400 y más	Sin esp / sin ing.	
Sí	21%	11%	10%	8%	14%
No	69%	76%	78%	64%	73%
NS/NC	10%	13%	12%	28%	13%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
N	124	124	81	25	354

P<0,05

NIVEL DE DISCRIMINACIÓN HACIA PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIH-SIDA

Nivel de discriminación hacia personas que viven con el VIH-SIDA según zona

	ZONA		Total
	CAPITAL	GBA	
Alto	30%	37%	35%
Medio	31%	30%	31%
Bajo	38%	33%	34%
Total	100%	100%	100%
N	102	252	354

No significativo

Nivel de discriminación hacia personas que viven con el VIH-SIDA según sexo

	SEXO		
	Masculino	Femenino	Total
Alto	35%	35%	35%
Medio	33%	28%	31%
Bajo	32%	36%	34%
Total	100%	100%	100%
N	178	176	354

No significativo

Nivel de discriminación hacia personas que viven con el VIH-SIDA según grupo de edad

	GRUPO DE EDAD			
	15-24	25-44	45-64	Total
Alto	35%	28%	43%	35%
Medio	40%	29%	27%	31%
Bajo	26%	43%	31%	34%
Total	100%	100%	100%	100%
N	81	130	143	354

$P < 0,05$

Nivel de discriminación hacia personas que viven con el VIH-SIDA según nivel educacional

	NIVEL EDUCACIONAL			
	H/ Primaria Incompleta	Prim. Completa H/ Secund. Inc.	Secundaria Completa y +	Total
Alto	55%	35%	25%	35%
Medio	19%	31%	36%	31%
Bajo	26%	34%	39%	34%
Total	100%	100%	100%	100%
N	58	191	105	354

$P < 0,01$

Nivel de discriminación hacia personas que viven con el VIH-SIDA según nivel ocupacional

	NIVEL OCUPACIONAL				
	No Manual	Manual Alto	Manual Bajo	No Ocupado	Total
Alto	25%	31%	47%	31%	35%
Medio	35%	33%	23%	34%	31%
Bajo	40%	36%	29%	34%	34%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
N	72	70	116	96	354

$P < 0,10$

Nivel de discriminación hacia personas que viven con el VIH-SIDA según ingreso per capita del hogar

	TRAMOS DE INGRESO PER CAPITA DEL HOGAR				
	Menos de \$160	\$160 a \$399	\$400 y más	Sin esp / sin ing.	Total
Alto	44%	27%	31%	52%	35%
Medio	25%	32%	38%	28%	31%
Bajo	32%	42%	31%	20%	34%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
N	124	124	81	25	354

$P < 0,05$

Cuadros correspondientes al capítulo 8 *Actitudes con respecto al género y la homosexualidad*

ACTITUDES CON RESPECTO AL GÉNERO Y LA HOMOSEXUALIDAD

Grado de tradicionalidad según zona

	ZONA		Total
	CAPITAL	GBA	
Bajo	14%	16%	15%
Moderado	66%	47%	52%
Alto	21%	38%	33%
Total	100%	100%	100%
N	102	252	354

$P < 0,01$

Grado de tradicionalidad según sexo

	SEXO		Total
	Masculino	Femenino	
Bajo	22%	8%	15%
Moderado	50%	55%	52%
Alto	28%	38%	33%
Total	100%	100%	100%
N	178	176	354

$P < 0,001$

Grado de tradicionalidad según grupo de edad

	GRUPO DE EDAD			Total
	15-24	25-44	45-64	
Bajo	12%	14%	18%	15%
Moderado	67%	50%	46%	52%
Alto	21%	36%	36%	33%
Total	100%	100%	100%	100%
N	81	130	143	354

$P < 0,05$

Grado de tradicionalidad según nivel educacional

NIVEL EDUCACIONAL

	H/ Primaria Incompleta	Prim. Completa H/ Secund. Inc.	Secundaria Completa y +	Total
Bajo	19%	12%	18%	15%
Moderado	29%	52%	65%	52%
Alto	52%	36%	17%	33%
Total	100%	100%	100%	100%
<i>N</i>	58	191	105	354

P<0,001

Grado de tradicionalidad según nivel ocupacional

	NIVEL OCUPACIONAL				Total
	No Manual	Manual Alto	Manual Bajo	No Ocupado	
Bajo	15%	20%	12%	15%	15%
Moderado	57%	53%	49%	52%	52%
Alto	28%	27%	39%	33%	33%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
<i>N</i>	72	70	116	96	354

No significativo

Grado de tradicionalidad según ingreso per capita del hogar

	TRAMOS DE INGRESO PER CAPITA DEL HOGAR				Total
	Menos de \$160	\$160 a \$399	\$400 y más	Sin esp / sin ing.	
Bajo	10%	13%	20%	36%	15%
Moderado	45%	58%	56%	48%	52%
Alto	45%	29%	25%	16%	33%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
<i>N</i>	124	124	81	25	354

P<0,001

ACUERDO / DESACUERDO SOBRE LAS RELACIONES SEXUALES PREMATRIMONIALES ENTRE HOMBRES

Acuerdo / desacuerdo sobre las relaciones sexuales prematrimoniales entre hombres según zona

	ZONA		
	CAPITAL	GBA	Total
De acuerdo	89%	80%	83%
En desacuerdo	7%	15%	12%
Otra/NS/NC	4%	5%	5%
Total	100%	100%	100%
<i>N</i>	102	252	354

No significativo

Acuerdo / desacuerdo sobre las relaciones sexuales prematrimoniales entre hombres según sexo

SEXO

	Masculino	Femenino	Total
De acuerdo	90%	76%	83%
En desacuerdo	5%	20%	12%
Otra/NS/NC	5%	5%	5%
Total	100%	100%	100%
N	178	176	354

P<0,001

Acuerdo / desacuerdo sobre las relaciones sexuales prematrimoniales entre hombres según grupo de edad

	GRUPO DE EDAD			
	15-24	25-44	45-64	Total
De acuerdo	91%	84%	77%	83%
En desacuerdo	7%	12%	15%	12%
Otra/NS/NC	1%	4%	8%	5%
Total	100%	100%	100%	100%
N	81	130	143	354

P<0,10

Acuerdo / desacuerdo sobre las relaciones sexuales prematrimoniales entre hombres según nivel educacional

	NIVEL EDUCACIONAL			
	H/ Primaria Incompleta	Prim. Completa H/ Secund. Inc.	Secundaria Completa y +	Total
De acuerdo	66%	84%	90%	83%
En desacuerdo	26%	12%	6%	12%
Otra/NS/NC	9%	4%	5%	5%
Total	100%	100%	100%	100%
N	58	191	105	354

P<0,001

Acuerdo / desacuerdo sobre las relaciones sexuales prematrimoniales entre hombres según nivel ocupacional

	NIVEL OCUPACIONAL				
	No Manual	Manual Alto	Manual Bajo	No Ocupado	Total
De acuerdo	85%	91%	79%	79%	85%
En desacuerdo	8%	6%	15%	18%	8%
Otra/NS/NC	7%	3%	6%	3%	7%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
N	72	70	116	96	354

No significativo

Acuerdo / desacuerdo sobre las relaciones sexuales prematrimoniales entre hombres según ingreso per capita del hogar

	TRAMOS DE INGRESO PER CAPITA DEL HOGAR				
	Menos de \$160	\$160 a \$399	\$400 y más	Sin esp / sin ing.	Total
De acuerdo	77%	85%	89%	80%	83%
En desacuerdo	18%	12%	6%	8%	12%
Otra/NS/NC	5%	3%	5%	12%	5%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
N	124	124	81	25	354

No significativo

ACUERDO / DESACUERDO SOBRE LAS RELACIONES SEXUALES PREMATRIMONIALES ENTRE MUJERES

Acuerdo / desacuerdo sobre las relaciones sexuales prematrimoniales entre mujeres según zona

	ZONA		
	CAPITAL	GBA	Total
De acuerdo	88%	77%	80%
En desacuerdo	8%	19%	16%
Otra/NS/NC	4%	4%	4%
Total	100%	100%	100%
N	102	252	354

$P < 0,05$

Acuerdo / desacuerdo sobre las relaciones sexuales prematrimoniales entre mujeres según sexo

	SEXO		
	Masculino	Femenino	Total
De acuerdo	87%	74%	80%
En desacuerdo	8%	23%	16%
Otra/NS/NC	5%	3%	4%
Total	100%	100%	100%
N	178	176	354

$P < 0,001$

Acuerdo / desacuerdo sobre las relaciones sexuales prematrimoniales entre mujeres según grupo de edad

	GRUPO DE EDAD			
	15-24	25-44	45-64	Total
De acuerdo	88%	82%	75%	80%
En desacuerdo	11%	16%	18%	16%
Otra/NS/NC	1%	2%	7%	4%
Total	100%	100%	100%	100%
N	81	130	143	354

$P < 0,10$

Acuerdo / desacuerdo sobre las relaciones sexuales prematrimoniales entre mujeres según nivel educacional

	NIVEL EDUCACIONAL			
	H/ Primaria Incompleta	Prim. Completa H/ Secund. Inc.	Secundaria Completa y +	Total
De acuerdo	62%	82%	87%	80%
En desacuerdo	29%	15%	10%	16%
Otra/NS/NC	9%	3%	4%	4%
Total	100%	100%	100%	100%
N	58	191	105	354

$P < 0,001$

Acuerdo / desacuerdo sobre las relaciones sexuales prematrimoniales entre mujeres según nivel ocupacional

	NIVEL OCUPACIONAL			
	No Manual	Manual Alto	Manual	No

			Bajo	Ocupado	
De acuerdo	79%	87%	79%	77%	80%
En desacuerdo	14%	11%	17%	19%	16%
Otra/NS/NC	7%	1%	3%	4%	4%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
<i>N</i>	72	70	116	96	354

No significativo

Acuerdo / desacuerdo sobre las relaciones sexuales prematrimoniales entre mujeres según ingreso per capita del hogar

	TRAMOS DE INGRESO PER CAPITA DEL HOGAR				
	Menos de \$160	\$160 a \$399	\$400 y más	Sin esp / sin ing.	Total
De acuerdo	76%	80%	86%	84%	80%
En desacuerdo	21%	17%	9%	8%	16%
Otra/NS/NC	3%	3%	5%	8%	4%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
<i>N</i>	124	124	81	25	354

No significativo

ACUERDO / DESACUERDO SOBRE LA INFIDELIDAD SEXUAL DE LOS HOMBRES

Acuerdo / desacuerdo sobre la infidelidad sexual de los hombres según zona

	ZONA		
	CAPITAL	GBA	Total
De acuerdo	16%	17%	17%
En desacuerdo	72%	69%	70%
Otra/NS/NC	13%	14%	13%
Total	100%	100%	100%
<i>N</i>	102	252	354

No significativo

Acuerdo / desacuerdo sobre la infidelidad sexual de los hombres según sexo

	SEXO		
	Masculino	Femenino	Total
De acuerdo	25%	9%	17%
En desacuerdo	55%	86%	70%
Otra/NS/NC	21%	6%	13%
Total	100%	100%	100%
<i>N</i>	178	176	354

P<0,001

Acuerdo / desacuerdo sobre la infidelidad sexual de los hombres según grupo de edad

	GRUPO DE EDAD			
	15-24	25-44	45-64	Total
De acuerdo	19%	15%	18%	17%
En desacuerdo	70%	73%	67%	70%
Otra/NS/NC	11%	12%	15%	13%
Total	100%	100%	100%	100%
<i>N</i>	81	130	143	354

No significativo

Acuerdo / desacuerdo sobre la infidelidad sexual de los hombres según nivel educacional

	NIVEL EDUCACIONAL			
	H/ Primaria Incompleta	Prim. Completa H/ Secund. Inc.	Secundaria Completa y +	Total
De acuerdo	10%	19%	15%	17%

En desacuerdo	76%	70%	67%	70%
Otra/NS/NC	14%	11%	18%	13%
Total	100%	100%	100%	100%
N	58	191	105	354

No significativo

Acuerdo / desacuerdo sobre la infidelidad sexual de los hombres según nivel ocupacional

NIVEL OCUPACIONAL

	No Manual	Manual Alto	Manual Bajo	No Ocupado	Total
De acuerdo	11%	24%	16%	16%	17%
En desacuerdo	75%	54%	73%	74%	70%
Otra/NS/NC	14%	21%	10%	10%	13%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
N	72	70	116	96	354

$P < 0,10$

Acuerdo / desacuerdo sobre la infidelidad sexual de los hombres según ingreso per capita del hogar

TRAMOS DE INGRESO PER CAPITA DEL HOGAR

	Menos de \$160	\$160 a \$399	\$400 y más	Sin esp / sin ing.	Total
De acuerdo	15%	17%	24%	4%	17%
En desacuerdo	76%	69%	62%	72%	70%
Otra/NS/NC	10%	14%	15%	24%	13%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
N	124	124	81	25	354

No significativo

ACUERDO / DESACUERDO SOBRE LA INFIDELIDAD SEXUAL DE LAS MUJERES

Acuerdo / desacuerdo sobre la infidelidad sexual de las mujeres según zona

ZONA

	CAPITAL	GBA	Total
De acuerdo	14%	14%	14%
En desacuerdo	75%	74%	74%
Otra/NS/NC	12%	12%	12%
Total	100%	100%	100%
N	102	252	354

No significativo

Acuerdo / desacuerdo sobre la infidelidad sexual de las mujeres según sexo

SEXO

	Masculino	Femenino	Total
De acuerdo	19%	9%	14%
En desacuerdo	62%	87%	74%
Otra/NS/NC	19%	4%	12%
Total	100%	100%	100%
N	178	176	354

$P < 0,001$

Acuerdo / desacuerdo sobre la infidelidad sexual de las mujeres según grupo de edad

GRUPO DE EDAD

	15-24	25-44	45-64	Total
De acuerdo	15%	12%	16%	14%
En desacuerdo	75%	77%	71%	74%
Otra/NS/NC	10%	12%	13%	12%
Total	100%	100%	100%	100%
N	81	130	143	354

$P < 0,10$

Acuerdo / desacuerdo sobre la infidelidad sexual de las mujeres según nivel educacional

	NIVEL EDUCACIONAL			
	H/ Primaria Incompleta	Prim. Completa H/ Secund. Inc.	Secundaria Completa y +	Total
De acuerdo	10%	15%	14%	14%
En desacuerdo	79%	75%	70%	74%
Otra/NS/NC	10%	9%	16%	12%
Total	100%	100%	100%	100%
N	58	191	105	354

$P < 0,001$

Acuerdo / desacuerdo sobre la infidelidad sexual de las mujeres según nivel ocupacional

	NIVEL OCUPACIONAL				
	No Manual	Manual Alto	Manual Bajo	No Ocupado	Total
De acuerdo	10%	19%	15%	14%	14%
En desacuerdo	75%	64%	77%	78%	74%
Otra/NS/NC	15%	17%	9%	8%	12%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
N	72	70	116	96	354

No significativo

Acuerdo / desacuerdo sobre la infidelidad sexual de las mujeres según ingreso per capita del hogar

	TRAMOS DE INGRESO PER CAPITA DEL HOGAR				Total
	Menos de \$160	\$160 a \$399	\$400 y más	Sin esp / sin ing.	
De acuerdo	12%	15%	20%	4%	14%
En desacuerdo	82%	74%	64%	72%	74%
Otra/NS/NC	7%	11%	16%	24%	12%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
N	124	124	81	25	354

No significativo

CONCEPCIONES SOBRE LA HOMOSEXUALIDAD

Concepciones sobre la homosexualidad según zona

	ZONA		
	CAPITAL	GBA	Total
Una práctica sexual más	53%	34%	40%
Enfermedad / Vicio	28%	45%	40%
NS/NC	19%	21%	20%
Total	100%	100%	100%
N	102	252	354

$p < 0,01$

Concepciones sobre la homosexualidad según sexo

	SEXO			Total
	Masculino	Femenino		
Una práctica sexual más	34%	45%		40%
Enfermedad / Vicio	48%	32%		40%
NS/NC	17%	23%		20%
Total	100%	100%		100%
<i>N</i>	178	176		354

$p < 0,01$

Concepciones sobre la homosexualidad según grupo de edad

	GRUPO DE EDAD			
	15-24	25-44	45-64	Total
Una práctica sexual más	56%	41%	29%	40%
Enfermedad / Vicio	25%	41%	49%	40%
NS/NC	20%	19%	22%	20%
Total	100%	100%	100%	100%
<i>N</i>	81	130	143	354

$p < 0,01$

Concepciones sobre la homosexualidad según nivel educacional

	NIVEL EDUCACIONAL				Total
	H/ Primaria Incompleta	Prim. Completa H/ Secund. Inc.	Secundaria Completa y +		
Una práctica sexual más	26%	35%	55%		40%
Enfermedad / Vicio	43%	48%	25%		40%
NS/NC	31%	17%	20%		20%
Total	100%	100%	100%		100%
<i>N</i>	58	191	105		354

$P < 0,001$

Concepciones sobre la homosexualidad según nivel ocupacional

	NIVEL OCUPACIONAL				Total
	No Manual	Manual Alto	Manual Bajo	No Ocupado	
Una práctica sexual más	53%	37%	26%	48%	40%
Enfermedad / Vicio	32%	50%	47%	32%	40%
NS/NC	15%	13%	28%	20%	20%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
<i>N</i>	72	70	116	96	354

$P < 0,001$

Concepciones sobre la homosexualidad según ingreso per capita del hogar

	TRAMOS DE INGRESO PER CAPITA DEL HOGAR				Total
	Menos de \$160	\$160 a \$399	\$400 y más	Sin esp / sin ing.	
Una práctica sexual más	26%	48%	46%	48%	40%
Enfermedad / Vicio	51%	37%	37%	16%	40%
NS/NC	23%	15%	17%	36%	20%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
<i>N</i>	124	124	81	25	354

$P < 0,001$

Cuadros correspondientes al capítulo 9 Aspectos de comunicación y sida

FUENTE DE INFORMACIÓN

Fuentes de información según zona, sexo y grupo de edad

	ZONA		SEXO		GRUPO DE EDAD			Total
	CAPITAL	GBA	Masculino	Femenino	15-24	25-44	45+	
Periódico o revista	29%	27%	23%	31%	25%	27%	29%	28
Televisión	83%	83%	87%	79%	77%	79%	89%	83
Radio	29%	22%	28%	21%	23%	24%	25%	24
Pareja/Amigo/ Familiar/Compañero	53%	35%	45%	36%	70%	39%	27%	40
Trabajador de la salud	10%	10%	5%	15%	9%	16%	5%	10
Otros	23%	18%	21%	18%	32%	17%	16%	19
<i>N</i>	70	158	107	121	44	89	95	228

Fuentes de información según nivel educacional y nivel ocupacional

	NIVEL EDUCACIONAL			NIVEL OCUPACIONAL			Sin Ocupación	Total
	Bajo	Medio	Alto	No Manual	Manual Calificado	Manual No Calificado		
Periódico o revista	21%	27%	31%	30%	25%	30%	24%	28%
Televisión	79%	84%	83%	75%	78%	91%	83%	83%
Radio	21%	23%	29%	21%	20%	32%	19%	24%
Pareja/Amigo/ Familiar/Compañero	38%	41%	40%	43%	43%	36%	41%	40%
Trabajador de la salud	6%	10%	11%	11%	5%	10%	12%	10%
Otros	15%	15%	30%	30%	18%	17%	14%	19%
<i>N</i>	34	124	70	53	40	77	58	228

Fuentes de información según nivel de ingresos

	NIVEL DE INGRESOS				Total
	Bajo	Medio	Alto	Sin ingresos	
Periódico o revista	26%	29%	29%	22%	28%
Televisión	79%	84%	85%	83%	83%
Radio	23%	19%	29%	39%	24%
Pareja/Amigo/ Familiar/Compañero	36%	47%	38%	33%	40%
Trabajador de la salud	15%	11%	4%	0%	10%
Otros	18%	16%	25%	28%	19%
<i>N</i>	73	89	48	18	228

CUESTIONARIO N°: _____

PM N°: _____

CUESTIONARIO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA LÍNEA DE BASE EN POBLACIÓN GENERAL

FONDO GLOBAL PARA LA LUCHA CONTRA EL SIDA,
LA MALARIA Y LA TBC.
PROYECTO ARGENTINA

**CEDOP (en INSTITUTO GINO GERMANI)
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES – 2007**

Lugar:	
Fecha:	
Nombre del entrevistador:	
Encuesta:	Completada
	Rechazo
	Pospuesta: Fecha:
Supervisada por:	Fecha:

Introducción: Mi nombre es... Estoy trabajando para la Universidad de Buenos Aires. Estamos entrevistando personas aquí en..... para recoger información que permita realizar programas de prevención del sida.

Confidencialidad y consentimiento: "Le voy a hacer algunas preguntas muy personales que a algunas personas les parecen difíciles de contestar. Sus respuestas son totalmente confidenciales. Su nombre no queda escrito en el cuestionario y no será usado nunca en relación con lo que me diga. No tiene obligación de contestar ninguna pregunta que no quiera contestar, y puede terminar la entrevista en cualquier momento que quiera. Pero tenga en cuenta que sus respuestas a estas preguntas nos ayudarán a comprender mejor lo que las personas piensan, dicen y hacen en relación con esa enfermedad. Agradecemos mucho que responda a esta encuesta. La encuesta llevará alrededor de 30 minutos. ¿Está dispuesto a participar?"

.....
 (Firma del encuestador certificando que el consentimiento informado ha sido dado verbalmente por el encuestado)

Sección 1: Variables sociales, contextuales y demográficas

P. Nº	Preguntas	Categorías de codificación	Salta ra
P101	Sexo	Masculino 1 Femenino 2	
P102	¿Cuántos años tiene? [<i>Tiene que tener entre 15 y 64 años. Si no, interrumpir la encuesta.</i>]	_____	
P103	¿Concurrió a la escuela?	Sí 1 No 2	P 105
P104	Nivel de educación alcanzado [<i>Nota: si contesta terciario, preguntar si completó el nivel primario y/o secundario</i>]	Primario incompleto 1 Primario completo 2 Secundario incompleto 3 Secundario completo 4 Terciario incompleto 5 Terciario completo 6 N/c 9	
P105	La semana pasada estuvo:	Trabajando tiempo completo 1 Trabajando medio tiempo 2 Sólo haciendo unas changas 3 Tenía empleo pero no trabajó por enfermedad, vacaciones, huelga 4	

		Desocupado, despedido, buscando trabajo 5 Estudiante 6 Haciendo tareas del hogar 7 Otro, cuál?..(Plan Jefes/Jefas)..... 8 Nunca trabajó 9 N/c 99	P 108 P 108 P 108 P 108 P 108
P106	¿Qué clase de trabajo hace / hacía habitualmente? Es decir, ¿cómo se llama o llamaba su ocupación principal?	Descripción de la ocupación	
P107	Su condición de ocupación es / era:	Asalariado en relación de dependencia 1 Asalariado bajo contrato 2 Asalariado en negro 3 Asalariado ocasional (changas) 4 Cuenta propia, trabajo autónomo 5 Patrón o socio, con personal 6 Trabajador familiar c/pago fijo 7 Trabajador familiar s/ pago fijo 8 (No corresponde) 97 No sabe 98 N/c 99	
P107b	¿Cuántas horas trabaja (trabajaba) usted habitualmente? [Nota: Para cuota de "activo" tiene que trabajar un mínimo de 18 horas.]	Nº de horas _____ (No recuerda /No sabe) 88 N/c 99	
P. Nº	Preguntas	Categorías de codificación	Salta r a
P108	¿Cuántas personas viven con Ud. en su misma casa?	Nº _____ Vive solo 20 Vive con otras personas pero no con un grupo doméstico 21 No sabe 98 N/c 99	
P109	En promedio, ¿a cuánto ascienden los ingresos globales mensuales de su grupo familiar / grupo doméstico? (si vive sólo, consignar cuánto gana)	Menos de 300 1 De 300 a 599 2 De 600 a 999 3 De 1000 a 1999 4 De 2000 a 3999 5 4000 y más 6 No sabe 8 N/c 9	

Sección 2: Parejas cohabitantes

<i>P N°</i>	Preguntas	Categorías de codificación	<i>Saltar a</i>
P200	¿Vive actualmente en pareja, ya sea con una mujer o con un hombre, como si estuviera casado/a?	Sí, con una mujer 1 Sí, con un hombre 2 No, no vivo en pareja 3	
P201	¿Y estuvo alguna vez casado/a o viviendo con una mujer / un hombre como si estuviera casado/a?	Sí, ahora, con una mujer 1 Sí, ahora, con un hombre 2 Sí, pero antes, con una mujer 3 Sí, pero antes, con un hombre 4 No, nunca 8 N/c 9	P 301
P202	¿Qué edad tenía cuando se casó o empezó a vivir con un hombre / una mujer?	Edad en años _____ No sabe 88 N/c 99	
P203	¿Cuál es su estado civil?	Casado 1 Unido de hecho 2 Divorciado 3 Separado 4 Viudo 5 Soltero, no se casó nunca 6 N/c 9	
P204	¿Cuánto tiempo hace que está casado/a o viviendo con alguien como si estuviera casado/a? Nota: Registrar 00 si hace menos de 1 año	Años _____ N/c 99	

Sección 3: Historia sexual: número y tipos de parejas

Le voy a hacer algunas preguntas sobre sus parejas sexuales en el último año. Algunas cosas pueden ser difíciles de recordar, pero me gustaría que respondiera a las preguntas lo mejor que pueda, porque esta información es muy importante para la encuesta. Le recuerdo que esta información es totalmente privada y anónima y su nombre no aparece en ningún lado.

<i>N°P.</i>	<i>Preguntas</i>	<i>Categorías de codificación</i>	<i>Saltar a</i>
P301	¿Tuvo alguna vez relaciones sexuales?	Sí 1 No 2 N/c 9	P 401

			P 401
P302	¿A qué edad tuvo relaciones sexuales por primera vez?	Edad _____ No sabe 88 N/c 99	
P303	La primera vez que tuvo relaciones sexuales, ¿usó preservativo?	Sí 1 No 2 (No recuerda) 8 N/c 9	
P304	¿Cuándo fue la última vez que tuvo relaciones sexuales?	Hace días 1 Hace semanas 2 Hace meses 3 Hace años 4 (No recuerda/No sabe) 8 N/c 9	P 401 P 401 P 401

Le voy a hacer algunas preguntas acerca de sus parejas sexuales:

Nº. P	Preguntas	Categorías de codificación	Saltar a
P305	Para mujeres: Piense en las parejas masculinas que tuvo en el último año Para varones: Piense en las parejas femeninas que tuvo en el último año: En total, cuántas parejas sexuales diferentes tuvo en el último año?	Total _____ No sabe 88 N/c 99	
P306	En total, ¿cuántas parejas sexuales diferentes tuvo en los últimos cinco años?	Total _____ No sabe 88 N/c 99	
P307	¿Alguna vez se vio obligado/a a tener relaciones sexuales contra su voluntad?	Sí 1 No 2 N/c 9	
P Nº	Preguntas	Categorías de codificación	Saltar a
P308	De las parejas que tuvo en el último año, ¿cuántas eran parejas con las que convivió, o “estables”? (+ de 6 meses)	Total parejas estables _____ No sabe 8 N/c 9	
P309	¿Cuántas de las parejas del último año eran parejas ocasionales, aunque no fueran relaciones “por dinero”?	Total parejas ocasionales _____ No sabe 88 N/c 99	

P310	¿Cuántas de sus relaciones sexuales del último año fueron a cambio de algo? (por dinero o por drogas)	Total parejas por dinero/drogas _____ No sabe 88 N/c 99	Mujeres: a P 401
P311	Para hombres Hablamos hasta ahora de sus parejas sexuales femeninas. ¿Tuvo alguna vez una pareja sexual masculina?	Sí 1 No 2 N/c 9	P 401 P 401
P312	¿Tuvo relaciones sexuales con alguno de esos hombres en el último año?	Sí 1 No 2 N/c 9	P 401 P 401
P313	¿Con cuántas parejas sexuales masculinas diferentes tuvo relaciones en el último año?	Nº de parejas masculinas _____ No sabe 88 N/c 99	

Sección 4: Historia sexual: parejas estables

Nº P.	Preguntas	Categorías de codificación	Saltar a
P401	(control) ¿Tuvo relaciones sexuales con una pareja estable en el último año?	Sí 1 No 2 No sabe 8 N/c 9	P 501 P 501 P 501
P402	La última vez que tuvo relaciones sexuales con una pareja estable ¿usaron preservativo? (pareja estable incluye esposo/a o conviviente o novio/a)	Sí 1 No 2 No sabe 8 N/c 9	P 404 P 405 P 405
P403	¿Quién sugirió usar preservativo esa vez?	Yo 1 Mi pareja 2 Los dos 3 No sabe 8 N/c 9	P 405 P 405 P 405 P 405 P 405
P Nº	Preguntas	Categorías de codificación	Saltar a
P404	¿Por qué no usaron preservativo esa vez? [No leer la lista.]	No teníamos 1 Es muy caro 2	

	Marcar todas las respuestas que se mencionan]	La pareja no quiso 3 No me gusta usarlo 4 No pensé que era necesario 5 No lo tuve presente 6 No es natural 7 Quita placer 8 Otra razón.....9 No sabe 88 N/c 99	
P405	¿Con qué frecuencia usaron preservativo con su pareja estable durante el último año?	Todas las veces 1 Casi siempre 2 A veces 3 Nunca 4 No sabe 8 N/c 9	
P406	La última vez que tuvieron relaciones sexuales con su pareja estable, ¿hicieron algo para evitar el embarazo?	Sí 1 No porque estaba embarazada 2 No porque quería embarazarme 3 No por otra razón 4 No sabe 8 N/c 9	P501 P501 P501 P501 P501
P407	¿Qué hicieron para evitar el embarazo? [No leer alternativas]	Preservativo 1 Píldora 2 DIU 3 Inyección 4 Terminar afuera 5 Método de los días 6 Otro.....7 No sabe 8 N/c 9	

Sección 5: Historia sexual: parejas por dinero/drogas

Nº P.	Preguntas	Categorías de codificación	Saltar a
P501	(Pregunta de control): ¿Tuvo relaciones sexuales por dinero/drogas en el último año?	Sí 1 No 2 No sabe 8 N/c 9	P 601
P502	Piense en las parejas por dinero/drogas que tuvo en el último año:	Nº de parejas ____ No sabe 88	

	En total: ¿con cuántas parejas tuvo sexo por dinero o por drogas?	N/c 99	
P N°	Preguntas	Categorías de codificación	Saltar a
P503	¿Cuántas parejas tuvo a las que “compró” sexo con dinero o con drogas?	N° de parejas _____ No sabe 88 N/c 99	
P504	¿Cuántas parejas tuvo a las que “vendió” sexo por dinero o por drogas?	N° de parejas _____ No sabe 88 N/c 99	
P505	La última vez que tuvo relaciones por dinero/drogas, ¿usó preservativo?	Sí 1 No 2 No sabe 8 N/c 9	P 507 P 508 P 508
P506	¿Quién sugirió usar preservativo esa vez?	Yo 1 Mi pareja 2 Los dos 3 No sabe 8 N/c 9	P 508 P 508 P 508 P 508 P 508
P507	¿Por qué no usaron preservativo esa vez? [No leer la lista. Marcar todas las respuestas que se mencionan]	No teníamos 1 Es muy caro 2 La pareja no quiso 3 No me gusta usarlo 4 No pensé que era necesario 5 No lo tuve presente 6 No es natural 7 Quita placer 8 Otra razón.....9 No sabe 88 N/c 99	
P508	¿Con qué frecuencia usó preservativo en el último año con sus parejas por dinero?	Siempre 1 Casi todas las veces 2 A veces 3 Nunca 4 No sabe 8 N/c 9	
P509	La última vez que tuvo relaciones sexuales por dinero, ¿hicieron algo para evitar el embarazo?	Sí 1 No 2 No sabe 8 N/c 9	
510	¿Qué hicieron para evitar el embarazo?	Preservativo 1 Píldora 2 DIU 3 Inyección 4	

		Terminar afuera	5
		Método de los días	6
		Otro.....	7
		No sabe	8
		N/c	9

Sección 6: Historia sexual: parejas ocasionales, no “por dinero”

Nº P.	Preguntas	Categorías de codificación	Saltar a
P601	(Pregunta de control): ¿Tuvo relaciones sexuales ocasionales (no por dinero) en el último año?	Sí 1 No 2 No sabe 8 N/c 9	P 701 P 701 P 701
P602	Piense en la pareja ocasional más reciente que tuvo: ¿La última vez que tuvo relaciones con esa pareja, usaron preservativo?	Sí 1 No 2 No sabe 8 N/c 9	P 604 P 605 P 605
P603	¿Quién sugirió usar preservativo esa vez?	Yo 1 Mi pareja 2 Los dos 3 No sabe 8 N/c 9	P 605 P 605 P 605 P 605 P 605
P604	¿Por qué no usaron preservativo esa vez? [No leer la lista. Marcar todas las respuestas que se mencionan]	No teníamos 1 Es muy caro 2 La pareja no quiso 3 No me gusta usarlo 4 No pensé que era necesario 5 No lo tuve presente 6 No es natural 7 Quita placer 8 Otra razón..... 9 No sabe 88 N/c 99	
P605	¿Con qué frecuencia usó preservativo en el último año con sus parejas ocasionales?	Siempre 1 Casi todas las veces 2 A veces 3 Nunca 4 No sabe 8 N/c 9	
P606	La última vez que tuvo relaciones sexuales con una pareja ocasional, ¿hicieron algo para evitar el embarazo?	Sí 1 No 2 No sabe 8 N/c 9	P701 P701 P701
P607	¿Qué hicieron para evitar el embarazo? [Puede marcarse más de una respuesta]	Preservativo 1 Píldora 2 DIU 3 Inyección 4 Terminar afuera 5 Método de los días 6 Otro.....7	

		No sabe 8	
		N/c 9	

Sección 7: ETS

Nº P.	Preguntas	Categorías de codificación	Saltar a
P701	¿Oyó hablar de enfermedades que se pueden transmitir a través de relaciones sexuales?	Sí 1 No 2 No sabe 8 N/c 9	P 704 P 704 P 704
P702	¿Puede describir algún síntoma de ETS en las mujeres? [No leer la lista Puede marcarse más de una alternativa]	Dolor abdominal 1 Flujo importante de la vagina 2 Picazón en el área genital 3 Ardor/quemazón al orinar 4 Dolor durante la relación sexual 5 Ulceras/ampollas genitales 6 Hinchazón en la zona genital 7 Sangre en la orina 8 Dificultades para orinar 9 Pérdida de peso 10 Esterilidad 11 No dan síntomas 12 Otro..... 13 No sabe 88 N/c 99	
P703	¿Puede describir algún síntoma de ETS en los hombres? [No leer la lista Puede marcarse más de una alternativa]	Dolor abdominal 1 Flujo del pene 2 Picazón en el área genital 3 Ardor/quemazón al orinar 4 Dolor durante la relación sexual 5 Ulceras / ampollas genitales 6 Hinchazón en la zona genital 7 Sangre en orina 8 Dificultades para orinar 9 Pérdida de peso 10 Impotencia 11 No dan síntomas 12 Otro..... 13 No sabe 88 N/c 99	
P704	Durante el último año, ¿tuvo flujo genital muy abundante o úlcera genital?	Sí 1 No 2 No sabe 8 N/c 9	P 801 P 801 P 801
P705	Cuando tuvo (nombrar síntoma) durante el último año, ¿buscó algún tipo de consejo o	Sí 1 No 2	P 708

	de tratamiento?	No sabe	8	P 708
		N/c	9	P 708

Nº P.	Preguntas	Categorías de codificación	Saltar a
P708	¿Qué puede hacer una mujer si sabe que su pareja tiene una ETS? [No leer las alternativas. Marcar la/s respuesta/s que mencione]	Negarse a tener relaciones Proponer el uso del preservativo Otra..... No sabe N/c	1 2 3 8 9

Sección 8: Conocimientos, opiniones y actitudes acerca del HIV/sida

Nº P.	Preguntas	Categorías de codificación	Saltar a
P801	Me gustaría ahora hacerle algunas preguntas acerca del sida: Durante el último mes, ¿escuchó o vio alguna información acerca del virus del sida?	Sí 1 No 2 No sabe 8 N/c 9	P803 P803 P803
P802	¿De qué fuentes recibió información acerca del virus del sida? [Leer la lista. Marcar todas las respuestas que mencione]	Periódico o revista 1 Televisión 2 Radio 3 Pareja 4 Amigo 5 Familiar 6 Trabajador de la salud 7 Compañero de trabajo/estudio 8 Otro..... 9 No sabe 88 N/c 99	
P803	Durante el último mes, ¿habló sobre temas sexuales con su pareja?	Sí 1 No 2 No sabe 8 N/c 9	
P804	Durante el último mes ¿habló del sida con alguien?	Sí 1 No 2 No sabe 8 N/c 9	P806 P806 P806

Nº P.	Preguntas	Categorías de codificación	Saltar a
P806	¿Cómo se transmite el virus del sida? [No leer la lista. Marcar todas las alternativas que mencione. Sólo decir: "¿algo más?"]	Usando drogas (no dice compartir agujas) 1 Compartiendo equipo de inyección 2 Relaciones sexuales sin especificar 3 Relaciones homosexuales 4 Tener sexo sin preservativo 5 Transfusiones 6 Transmisión madre-hijo 7 De otro modo: cuál?..... 8 No sabe 88 N/c 99	
P807	¿Hay algo que una persona puede hacer para evitar la transmisión del virus del sida?	Sí 1 No 2 No sabe 8 N/c 9	P 808 P 808 P 808
P808	¿De qué modos pueden las personas protegerse de la transmisión del virus del sida? [Marcar todas las respuestas mencionadas. No leer la lista]	Usar preservativos 1 Tener menos parejas sexuales 2 Los dos miembros de la pareja no tienen otras parejas 3 No tener sexo con cualquier persona 4 No tener relaciones sexuales 5 No tener sexo por dinero 6 Evitar inyecciones con agujas contaminadas 7 Evitar las transfusiones de sangre 8 Otro..... 9 No sabe 88 N/c 99	
P809	¿Pueden los mosquitos transmitir el VIH, el virus que causa el sida?	Sí 1 No 2 No sabe 8 N/c 9	
P810	¿Puede transmitirse el VIH, el virus que causa el sida, al usar el mismo inodoro que una persona que tiene el virus?	Sí 1 No 2 No sabe 8 N/c 9	
P811	¿Puede el virus transmitirse de la madre al hijo?	Sí 1 No 2 No sabe 8 N/c 9	

Nº P.	Preguntas	Categorías de codificación	Saltar a
P812	Puede la madre transmitirle el virus del sida al niño: a) ¿Durante el embarazo o en el parto? b) ¿A través de la lactancia?	a) Sí 1 No 2 N/s 8 N/c 9	b) Sí 1 No 2 N/s 8 N/c 9
P813	Si una mujer embarazada tiene el virus del sida, ¿hay algo que pueda hacer para evitar la transmisión del virus al bebé?		Sí 1 No 2 No sabe 8 N/c 9 P 814 P 814 P 814
P814	¿Qué puede hacer? [No leer la respuesta. Puede marcarse más de una opción]		Tomar medicación 1 No dar de mamar 2 Tener el bebé por cesárea 3 Otra respuesta.....4 No sabe 8 N/c 9
P816	Desde que oyó hablar del sida ¿hizo algo para evitar pescárselo Ud.?		Sí 1 No 2 No, porque ya era VIH positivo 3 No sabe 8 N/c 9 P901 P901 P901
P817	¿Qué puede hacer? [No leer la respuesta. Puede marcarse más de una opción]		Usar preservativo 1 Disminuir el número de parejas 2 Dejar de consumir drogas 3 Otra.....4 No sabe 8 N/c 9

Sección 8a: Riesgo

Nº P	Preguntas	Categorías de codificación	Saltar a
P851	Hasta donde usted sabe, ¿puede alguien determinar con certeza si tiene VIH/SIDA a partir de ...?	Un análisis de sangre 1 Un examen físico 2 Un diagnóstico hecho por la propia persona 3 Una radiografía...4 No sabe 8 N/c 9	
P852	Hasta donde usted sabe ¿existe una iniciativa general del Gobierno Nacional respecto del VIH/SIDA?	Sí 1 No 2 No sabe 8 N/c 9	
P853	¿Cómo calificaría usted su propio riesgo personal de contraer el VIH, usando una escala donde 1 indica un riesgo muy bajo, 7 un riesgo muy alto y el punto medio 4 un riesgo moderado? [Nota: Mostrar Cuestionario]	1. Riesgo muy bajo 1 2 3 4. Riesgo moderado 4 5 6 7. Riesgo muy alto 7 No sabe 8 N/c 9	P901 P901

Nº P	Preguntas	Categorías de codificación	Saltar a
P854	<p><i>BAJO RIESGO (1 a 3) NO LEER LA LISTA. ACEPTAR HASTA TRES RESPUESTAS.</i></p> <p>¿Por qué piensa usted que su propio riesgo personal de contraer el VIH es bajo?</p>	<p>No soy gay 1 Soy casado / Una única pareja / Monógamo 2 No soy sexualmente activo 3 Siempre uso preservativos 4 No consumo drogas 5 Otro :6 (No corresponde 97) No sabe 98 N/c 99</p>	
P855	<p><i>RIESGO MODERADO (4) NO LEER LA LISTA. ACEPTAR HASTA TRES RESPUESTAS.</i></p> <p>¿Por qué piensa usted que su propio riesgo personal de contraer el VIH es moderado?</p>	<p>No soy gay 1 Sólo tengo una pareja 2 No soy sexualmente activo 3 Siempre uso preservativos 4 No consumo drogas 5 Tengo múltiples parejas 6 Consumo drogas 7 No uso preservativos 8 Mi pareja es VIH positivo 9 Otro: 10 (No corresponde 97) No sabe 98 N/c 99</p>	
P856	<p><i>RIESGO MUY ALTO (5 a 7) NO LEER LA LISTA. ACEPTAR HASTA TRES RESPUESTAS.</i></p> <p>¿Por qué piensa usted que su propio riesgo personal de contraer el VIH es muy alto?</p>	<p>Tengo múltiples parejas 1 Consumo drogas 2 No uso preservativos 3 Mi pareja es VIH positivo 4 Otro:5 (No corresponde 97) No sabe 98 N/c 99</p>	

Sección 9: Actitudes hacia las personas que viven con VIH, la homosexualidad y cuestiones de género

Nº P.	Preguntas	Categorías de codificación	Saltar a
P901	¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que los hombres mantengan relaciones sexuales antes de casarse?	<p align="right">Está de acuerdo 1 Está en desacuerdo 2 No tiene opinión al respecto 3 Otra..... 4 N/c 9</p>	
P902	¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con respecto a que las mujeres mantengan relaciones sexuales antes de casarse?	<p align="right">Está de acuerdo 1 Está en desacuerdo 2 No tiene opinión al respecto 3 Otra..... 4 N/c 9</p>	
P903	¿Y cuál es su posición con respecto al siguiente enunciado...? “Es aceptable que los <i>hombres</i> cometan infidelidades sexuales”	<p align="right">Está de acuerdo 1 Está en desacuerdo 2 No tiene opinión al respecto 3 Otra..... 4 N/c 9</p>	
P904	¿Y cuál es su posición con respecto a este otro enunciado ...? “Es aceptable que las <i>mujeres</i> cometan infidelidades sexuales”	<p align="right">Está de acuerdo 1 Está en desacuerdo 2 No tiene opinión al respecto 3 Otra..... 4 N/c 9</p>	
P905	¿Conoce personalmente a alguien que tiene el VIH o que ha muerto de sida?	<p align="right">Sí 1 No 2 No sabe 8 N/c 9</p>	
P906	¿Compartiría una comida con una persona que sabe o sospecha que tiene VIH o sida?	<p align="right">Sí 1 No 2 No sabe 8 N/c 9</p>	
P907	¿Tomaría del mismo vaso que una persona que sabe o sospecha que tiene VIH o sida?	<p align="right">Sí 1 No 2 No sabe 8 N/c 9</p>	
P908	Si un miembro de su familia se enfermara de sida, ¿estaría dispuesto a cuidarlo en su casa?	<p align="right">Sí 1 No 2 No sabe 8</p>	

		N/c	9	
P909	Si un maestro tiene sida, ¿piensa que se le debería permitir seguir enseñando en la escuela?	Sí	1	
		No	2	
		No sabe	8	
		N/c	9	
Nº P.	Preguntas	Categorías de codificación		Saltar a
P910	¿Si se entera que alguien que vende frutas y verduras tiene el sida, le seguiría comprando?	Sí	1	
		No	2	
		No sabe	8	
		N/c	9	
P911	¿Si un miembro de su familia se enfermara de sida, querría que lo mantuviera en secreto?	Sí	1	
		No	2	
		No sabe	8	
		N/c	9	
P912	Para Ud. la homosexualidad es:	Una enfermedad	1	
		Un vicio	2	
		Una práctica sexual más	3	
		No sabe	8	
		N/c	9	
P913	No quiero que me diga los resultados, pero ¿alguna vez se hizo la prueba del VIH?	Sí	1	
		No	2	
		No sabe	8	
		N/c	9	
P914	¿Fue a buscar el resultado de la prueba?	Sí	1	
		No	2	
		No sabe	8	
		N/c	9	
P915	¿En el último año se hizo la prueba del VIH?	Sí	1	
		No	2	P 919
		No sabe	8	P 919
		N/c	9	P 919
P916	¿Comentó con alguien el resultado de la prueba?	Sí	1	
		No	2	P 913
		No sabe	8	P 913
		N/c	9	P 913
P917	¿A quién se lo comentó? [Marcar todas las respuestas].	Pareja sexual	1	
		Amigo	2	
		Familiar	3	
		Trabajador de la salud	4	
		Compañero de trabajo	5	
		Otro	6	
P918	Cuando se hizo la prueba, ¿la hizo voluntariamente o se la pidieron?	Voluntario	1	
		Requerido	2	
		No sabe	8	
		N/c	9	

P919	¿Alguna vez le hicieron la prueba del VIH sin consultarlo?	Sí	1	
		No	2	
		No sabe	8	
		N/c	9	

Nº P.	Preguntas	Categorías de codificación	Saltar a
P920	¿Querría hacerse (volver a hacerse) la prueba del VIH?	Sí 1 No 2 No sabe 8 N/c 9	
P921	¿Conoce un lugar donde podría concurrir para hacérsela?	Sí 1 No 2 No sabe 8 N/c 9	
P922	Si quisiera hacer la prueba, ¿dónde podría ir?	A un centro para detección de VIH 1 A un hospital/clínica 2 A una farmacia 3 A un centro de planificación familiar 4 A una "salita" o CAPS 5 Otro..... 6 No sabe 8 N/c 9	
P923	Si la prueba le diera / dio un resultado positivo, ¿sabría / supo adónde dirigirse para consultar?	Sí 1 No 2 N/c 9	
P924	¿Tiene alguna cobertura de salud?	Sí, obra social 1 Sí, prepaga privada 2 Sí, servicio de emergencia 3 Sí, plan médico de hospital público 4 No tiene cobertura 5 No sabe 8 N/c 9	

Si el encuestado es Varón, pasar a Pregunta Nº 1013

Sección 10: Embarazo y cuidados prenatales (sólo para mujeres)

Nº P	Preguntas	Categorías de codificación	Saltar a
P1001	¿Tuvo hijos?	Sí 1 No 2 N/c 9	P 1011 P 1011
P 1002	¿Cuántos hijos tuvo?	Nº de nacidos vivos: _____	

P 1003	¿Cuánto hace que tuvo su último hijo?	Mes _____ No sabe 8 Año _____ No sabe 8	
P1004	¿Fue a hacerse controles del embarazo durante el último embarazo?	Sí 1 No 2 No sabe 8 N/c 9	P 1011 P 1011 P 1011
Nº P	Preguntas	Categorías de codificación	Saltar a
P1005	¿Cuántos controles se hizo durante el último embarazo?	1 a 3 1 4 a 6 2 Más de 6 3 No sabe 8 N/c 9	
P1006	¿En qué momento del embarazo fue a hacerse el primer control?	Semanas de embarazo _____	
P1007	Cuando fue a hacerse los controles, ¿le dieron alguna información o le aconsejaron con respecto al VIH?	Sí 1 No 2 No sabe 8 N/c 9	
P1008	¿Le ofrecieron hacerle la prueba del VIH durante alguna de las visitas de control?	Sí 1 No 2 No sabe 8 N/c 9	
P1009	¿Estuvo de acuerdo en hacerse la prueba del VIH durante alguna de esas visitas de control?	Sí 1 No 2 No sabe 8 N/c 9	
P1010	¿Recibió los resultados de la prueba?	Sí 1 No 2 No sabe 8 N/c 9	
P1011	¿Está embarazada ahora?	Sí 1 No 2 No sabe 8 N/c 9	P 1013 P 1013 P 1013
P1012	¿Fue a visitas de control prenatal durante este embarazo?	Sí 1 No 2 No sabe 8 N/c 9	
P1013	(PARA TODOS): ¿Diría usted que el VIH/SIDA en la Argentina hoy en día es un problema ...?	Para nada grave 1 Apenas grave 2 Grave 3 Muy grave 4 No sabe para opinar 8	

		N/c 9	
P1014	(PARA TODOS): ¿Cuál es su grado de acuerdo o desacuerdo con la afirmación que sigue ...? “El VIH/SIDA es un problema mucho menor en la Argentina de hoy que lo que lo era hace diez años”.	Totalmente de acuerdo 1 De acuerdo hasta cierto punto 2 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 Más bien algo en desacuerdo 4 Totalmente en desacuerdo 5 No sabe para opinar 6 N/c 9	